


6. Волнистые желѣз. пески 0,25 м.
7. Голубовато-сѣрые пески. 3 »

Около 5,5 м.

Выше по оврагу, съ лѣваго берега, въ боковомъ оврагѣ, показываются наверху выходы размытаго мергеля (налегающаго въ другихъ мѣстахъ на мѣль). Онъ заключаетъ, въ данной мѣстности, массу раковинъ различныхъ видовъ рода *Inoceramus*, разнообразной величины. Здѣсь, по справедливости, можно его назвать надмѣловымъ *Иносега*м'овымъ мергелемъ. Въ слѣдующемъ овражкѣ выходитъ бѣлый мѣль, съ глауконитовыми зернами. Онъ имѣетъ здѣсь значительный удѣльный вѣсъ и кремнистый характеръ. И мергель и мѣль раздроблены многочисленными — трещинами на куски. Мѣль переполненъ кусками створокъ *Inoceramus*.

Близъ *Орѣховичей*, нѣсколько выше по лѣвому берегу, выходитъ аллювіальный новый наносъ, въ 2 метра толщины, и въ немъ перемѣшаны песокъ съ фосфоритовыми галь-



Петрово и Ружное Карачевского уѣзда.

ками; болѣе крупные кругляки фосфорита также попадаютъ здѣсь. Затѣмъ въ томъ же наносѣ перемѣшаны куски подмѣловаго мергеля съ типичными *Pecten* и *Ostrea canaliculata*; мѣль съ кусками *Inoceram.* (замочный край въ нѣсколькихъ экземплярахъ). Съ