

налегающихъ глинь. Поэтому основной коренной породой, составляющей почву города Сѣвска надо принять бѣлый мѣль. Мѣстами онъ покрытъ слюньбакомъ, а гдѣ и слоистыми песками, которые по нѣкоторымъ соображеніямъ, приведеннымъ въ геотектоникѣ данной мѣстности, должны быть причислены къ третичнымъ. Слой ихъ здѣсь весьма незначителенъ, и потому мѣль часто проглядываетъ наружу. См. рис. стр. 435.

Кромѣ того сдѣлана была мною еще поѣздка по пространству между Трубчевскомъ и Сѣвскомъ, но вслѣдствіе низменнаго характера мѣстности и по отсутствію овраговъ, я никакихъ данныхъ не нашелъ. Подъ большими лѣсами можно замѣтить развитіе бѣлыхъ песковъ которые тянутся на громадное пространство отъ рѣки Десны. Начиная отъ станцій Погоща появляются суглинки¹⁾.

Карачевъ. Близъ желѣзной дороги, у острога, и кирпичныхъ сараевъ производится разработка рыхлаго песчаника, дикаго цвѣта — грязнаго зеленовато-сѣраго. Онъ употребляется въ самомъ Карачевѣ, между прочимъ для устилки шоссе и сложенъ здѣсь въ кучи, въ которыхъ видъ его поразительно напоминаетъ щебень фосфорита. Онъ такой-же крупно-ноздреватый и мелко пористый.

Сверху налегаютъ красныя глины въ 0,5 м. Затѣмъ слѣдуетъ слой тонкой зеленовато-сѣрой глины въ 0,15. Наконецъ пески съ песчаникомъ, сѣро-зеленаго цвѣта. Нижніе слои ихъ слабые, верхніе тверже.

Чрезвычайно рѣдко попадаются окаменѣлости и отпечатки. Такъ мнѣ удалось отыскать экземпляръ Брахіопода, который при выкалываніи раскололся. По общему виду онъ напоминаетъ *Spir. muralis*. По остаткамъ сломаннаго клювика опредѣлить нельзя. Кромѣ того попадаютъ буроватыя рыбы чешуи въ 0,004—0,006. (Предполагается буреніе).

Богдановка. Имѣніе г. Нарышкиной близъ станціи того же имени.

Къ югу отъ станціи Нарышкиной, въ 4 верстахъ расположена Богдановка, на берегу рѣки Цона. Въ семи верстахъ от-

1) См. стр. 432.