

рѣки *), выходитъ только мѣлъ,—это на югѣ, а равно и на сѣверѣ того же Сѣвскаго уѣзда мы опять находимъ или только мѣлъ или же надмѣловой иноцерамовый мергель, здѣсь мы имѣемъ одно звѣно, связывающее всѣ мѣловыя образованія этого уѣзда съ отложеніями города Дмитровска.

РАЗРѢЗЪ ВЪ *Клинцахъ*.

1. Бурая глины:

2. Бѣлая песчанистая сурка, обильно проникнутая фосфоритомъ.

3. Сѣрозеленые фосфоритоносные пески.

Сопоставивъ съ этимъ рядомъ выходящій въ Апажѣ мѣлъ, мы не имѣемъ только мѣлоподобныхъ мергелей, которыхъ нѣтъ и въ городѣ Дмитровскѣ.

Въ оврагахъ *Добрички* мы находимъ выходы лѣса, а внизу, въ логу торфъ.

Алешокъ Починокъ. Въ глубинѣ большого оврага, въ днѣ его выходы кореннаго мѣла. $4^{\circ}27'$.

Юшки. Въ нѣсколькихъ оврагахъ, въ 4—5 верстахъ, недоѣзжая съ Березовца до Юшкова, выходятъ толщи лѣса въ 3—4 метра; больше ничего другаго въ этихъ оврагахъ не видно.

Гапоново (98,6). Около Гапонова также незначительные выходы только одного лѣса. $4^{\circ}20'$ и $52^{\circ}9'$ с. ш.

Доброводье, Курск. г., Дмитр. у. Пробожье Поле. Здѣсь покровнымъ слоемъ являются плотныя красно-бурая глины и вся мѣстность, особенно около почтовой станціи Пробожье Поле является весьма унылой и однообразной. Часто можно видѣть близъ дороги и далеко въ сторонѣ, въ почти ровной — едва холмистой мѣстности, большія водныя пространства, которыя не обсыхаютъ въ самое жаркое и сухое лѣто. Покровный слой глинъ здѣсь такъ плотенъ, что не допускаетъ просачиванія воды, а незначительные уклоны вполне достаточны для того, чтобы самое незначительное количество выпавшей воды, собиралось съ значительной площади къ центральной нижайшей плоской котловинѣ.

*) Ур. Сѣва = 80 с.