

выходы, въ обрывахъ оврага, надмѣловыхъ мергелей и фосфоритовыхъ песковъ; жерновики не обнажаются.

На западѣ г. Соколовъ даетъ данныя для Глинца, Турейки, Воронца, Лебедихи и Тагина.

Въ полуверстѣ отъ с. *Гнильца*, по теченію р. Глинецъ есть выходы синеватой глины, «весьма похожей на юрскую ¹⁾».

Въ Бобриковомъ логу, въ водомоинахъ, подъ торфомъ темная глина, также принята г. Соколовымъ за юрскую.

Такіе же выходы находимъ по теченію р. Воронежъ, гдѣ подъ торфомъ выходитъ голубая глина. Близъ дер. «*Лебедихи*» есть выходы юрской глины съ сферосидеритомъ.

Въ долину самой Оки мы не находимъ указаній; такъ у г. Соколова находимъ только одно указаніе на разрѣзъ противъ Захаровки, въ которой «обнажились слоистые пески желтоватаго цвѣта». (Лос. cit. стр. 6). Къ востоку отъ Верхней Морозихи (ibid. стр. 7) въ боковыхъ оврагахъ большого лога, подъ толщею лѣса, достигающаго здѣсь слишкомъ 14 м. находимъ выходы фосфорита въ плитахъ.

«На днѣ оврага они выдаются на подобіе ступеней лѣстницы, «потому что напластованіе ихъ горизонтально, а дно оврага имѣетъ болѣе или менѣе значительный склонъ къ устью». Такихъ ступеней (—пластовъ) двѣ,—рѣже три.

«Почти подъ самой деревней Верхней Морозихой (высота «117 с.) находится оврагъ, представляющій сплошной разрѣзъ «на протяженіи полуверсты... Весь разрѣзъ имѣетъ до 40' высоты; до 25' обнажается исключительно слоистый песокъ, въ «верхнихъ слояхъ котораго видны нетолстые пропласты фосфорита. Надъ песками залегаетъ тонкій слой мѣлоподобнаго мергеля, довольно рыхлаго. На мергель прямо налелеаетъ лѣсъ».

Между нижнимъ Каменцомъ и Корсаковой найдены выходы сърой юрской глины съ окаменѣлостями.

Gryphaea dilatata и *Belemnites Panderi*.

Ниже по р. Траснѣ, по направленію къ Окѣ выходовъ нѣтъ.

1) «Кромской уѣздъ» Кудр. и Сокол. стр. 5.