

- | | |
|--|----------------------------------|
| 2. Синяя рухляковая глина. | } Всѣ 3 слоя
весьма
тонки. |
| 3. Желтый мергель. | |
| 4. Синяя рухляковая глина. | |
| 5. Плотный желтый трещиноватый доломитъ. | |
| 6. Плотный желтый доломитъ, выламывающійся
большими кубическими глыбами | |
| 7. Желтый трещиноватый известнякъ съ синими
пятнами. | |
| 8. Перемежающіе пласты сѣраго мергеля и бѣло-
ватаго известняка. | |
| 9. Синеватый тонкослоистый известнякъ. | |
| 10. Сѣро-желтый волнистый песчаникъ. | |
| 11. Плотный желто-сѣрый волнистый известнякъ. | |

Общая толщина всѣхъ 11 пластовъ только
5 метровъ.

«Продолженіемъ этого разрѣза *внизъ* (нисходящая послѣдо-
«ватаельность) должно считать пласты, обнаженные въ камено-
«ломняхъ въ самыхъ берегахъ Оки. Эти пласты у Половецкаго
«моста достигаютъ 23 метровъ высоты и *слабо склоняются* на
NNO.

В) 1. Тонкія плиты песчаника и желтоватаго мергеля	0,94 м.
2. Зеленый и сѣрый мергель	1,24 »
3. Желѣзистый песчаникъ; заключ. подчин. горо- ховидн. глинист. желѣзн.	3,72 »
4. Желтоватый песчанистый известнякъ	4,65 »
5. Тонкослоистый желтый и бѣлый известнякъ	2,79 »
6. Мелкостростковитый известнякъ	3,72 »
7. Свѣтло-бурый горькоземист. известн.	1,86 »
8. Свѣтло-сѣрый стростков. известнякъ частью ноз- древатый, съ крист. извест. шпата	1,86 »
9. Желтый горькоземистый извест.	0,47 »
10. Глинистый желтый известнякъ	0,47 »
11. Плотный известнякъ съ синими и желтыми пят- нами	1,24 »

Нижніе слои известняковъ содержатъ обломки ихтіолитовъ.
Holoptych. nobil. Diplopterus, Botriolepis, Cheliophorus Vern.