

ской губ. по наблюденіямъ Еремѣева, Барбота де-Марни, Романовскаго развита *Цитериновая* группа или *малевко-муравнинскія* отложенія характеризующіяся окаменѣлостями. *Cythere tulensis*, *Spirigera Puschiana*, *Productus fallax*, *Retzia tulensis*, *Chonetes pana*, *Spirif. glaber* и *Sp. inflatus*; *Arca oreliana*, *Astarte socialis*, *Leperditia nigrescens*.

Присутствіе *Sprf. Anossofi* показано Барботомъ повидимому по ошибкѣ.

По р. Кромѣ.

Кромá, начинаясь у села Жихарева, на границѣ Дмитрѣвскаго и Кромскаго уѣздовъ, течетъ съ небольшими извилинами на востокъ, почти по параллели $52^{\circ} 40'$. А потому, естественнымъ образомъ нивелируя мѣстность, она даетъ намъ рядъ послѣдовательныхъ разрѣзовъ въ одномъ направленіи. И только благодаря сильному, господствовавшему здѣсь размыванію, и характеру залегающихъ породъ, русло ея средняго теченія занесено песками и суглинками, которые вполнѣ прикрываютъ подлежающія породы.

Разрѣзы Каменца, Ключникова, Рыжкова, Новоселокъ и др. даютъ намъ указаніе на залеганіе внизу юрской келловейской темно-синей или сизовато-черной жирной глины (составляющ. водупорный слой); на нее налегаютъ жерновые песчаники и пески мѣловой системы.

Основнымъ разрѣзомъ для этой мѣстности я принимаю р. деревни Каменецъ, привед. у меня подъ № 18.

А именно.

1. Гумусъ	0,7	м.
2. Красно-бурая глина.	0,7	»
3. Мѣлоподобн. мергеля.	1,4	»
4. Голубые пески	2,2	»
5. Фосфоритъ	0,6	»
6. Желтоват. мелкоз. пески.	4,2	»
7. Фосфоритъ	0,3	»
8. Голубоватые пески.	0,3	»
9. Плотн. жерновой песч.	3,5	»