

«поверхность *рѣки* и нижними членами въ обнаженіяхъ являются «все болѣе и болѣе новыя группы пластовъ. Такъ, между *Курскомъ* и *Дроняевой*, исчезаютъ ярусы *саморода* и *сурки*; между *Дыновомъ* и *Рыльскомъ* скрывается *краснога*; а *мѣль* начинаетъ «непосредственно возвышаться надъ поверхностью долины; наконецъ въ окр. *Путивля* и самый *мѣль* уходитъ подъ поверхность «*рѣки*. Такое послѣдовательное исчезновеніе болѣе древнихъ ярусовъ подъ поверхностью *рѣки*, связанное съ соотвѣтственнымъ пониженіемъ болѣе новыхъ группъ пластовъ, ясно показываетъ, что «они имѣютъ паденіе, хотя и незамѣтное на короткихъ разстояніяхъ, всетаки значительно превосходящее наклоненіе dna долины. Мѣловыя толщи, вмѣстѣ съ другими ниже и выше лежащими пластами, понижаются въ указанномъ направленіи на 40 «саженъ; что составляетъ по прямой линіи 0,261 саж. на версту». (См. у Леваковского, стр. 33).

Детали этого вопроса у меня многократно указываются, какъ въ 1 такъ и во 2 части.

Особенно это касается *рѣкъ Свапы* и *Тускори*.

Относительно же общихъ выводовъ, я пришелъ къ тѣмъ же самымъ результатамъ, какъ и проф. *Леваковский*. Но такъ какъ первенство принадлежитъ ему, мои же наблюденія, во всѣхъ деталяхъ, подтверждаютъ ихъ, то я привелъ выводы г. *Леваковского*.

Оставляя Сеймъ въ сторонѣ, я имѣю еще нѣсколько данныхъ для р. *Клевени*.

А именно, разрѣзы въ бассейнѣ *Берюга*—даютъ, при высотѣ мѣстности въ 104 саж., слѣдующее.¹⁾ Въ *Малушиной* подъ толстыми покровами красно-бурой глины и лёсса лежатъ свиты пестрыхъ малиновыхъ, сѣрыхъ, бланжевыхъ и голубыхъ глинъ; нѣкоторые слои представляютъ *липныя* глины. Ниже слѣдуютъ большія толщи голубыхъ песковъ, съ прослоемъ зеленоватыхъ песковъ. Въ нижнихъ горизонтахъ заключаются бурые слои съ желѣзистыми конкреціями. Въ верхнихъ горизонтахъ голубыхъ песковъ лежитъ плотный песчаникъ.

1) См. на II табл. разрѣзъ F—съ гор. Дмитр. на Нов. Слб.