

6) (Иногда) *темно-зеленые и сѣро-зеленые илинистые пески*, переходящіе къ низу въ суглинки.

7) Охристые пески съ желѣзнякомъ.

8) *Мѣлъ* до 20 метровъ.

9) Сланцеватая сѣро-голубая глина (по Армашевскому).

Послѣдній слой.

Благодаря этому общему своду, который такъ сближаетъ намъ бассейны Ивота, Клевени и Эсмани, я могу сдѣлать слѣдующее наведеніе.

По руч. *Улановкѣ*, который, начинаясь въ Круглой Полянѣ, бѣжитъ чрезъ *Толстодубову*, *Суходолъ* и *Уланову*, мы найдемъ близь двухъ послѣднихъ селъ также выходы *мѣла*, покрытаго *зеленоватыми, илинистыми песками*. Вѣроятно и въ Кучеровкѣ и Ястребщинѣ выходитъ *мѣлъ* (приблизительно на 90 саж.).

Г. *Миклашевскій* (Геологія Глуховскаго уѣзда) даетъ еще слѣдующія указанія для интересующей насъ площади. На *хуторѣ Шкирмановкѣ* (что между Глуховомъ и Годуновкой) въ полуверстѣ хорошіе разрѣзы *мѣла*. Слѣды его въ оползняхъ по берегамъ р. *Есмани* ниже *Годуновки*.

Для послѣдней, уже мною описанной, г. *Миклашевскій* даетъ слѣдующія подробности.

«Мѣлъ, вверху рухляковый, а затѣмъ бѣлый пишущій, обнаженъ здѣсь подъ незначительнымъ слоемъ растительный, земли. Видимая мощность достигаетъ 50'. Подлежащая порода неизвѣстна. Мѣлъ расположенъ горизонтальными пластами и разбитъ трещинами, образующими глыбы то кубической, то косоугольной формы; отъ 1 до 2 арш. длиною и отъ 1 до 1½ арш. толщины. Изъ окаменѣлостей здѣсь встрѣчается громадное количество *Bell. mucr.*; *Ostrea vesicul.* и *Ost. Br.* Мѣлъ прикрытъ мѣстами *черной глиной* съ известковыми пятнами, рѣзкая бѣлизна которыхъ выдается еще болѣе на черномъ фонѣ глины».

Въ 4 верстахъ къ СВ. отъ *Годуновки*, въ урочищѣ «*Рябцева Нива*» находимъ слѣдующее: (см. Микл. стр. 4).

1) Черноземъ.

2) Сѣро-желтая песчанистая глина съ известковыми конкреціями.