

ровки на *Взмуть*, мы видѣли сильно развитые надмѣловые рухляки. Въ *Березѣ* — *бѣлый мѣлѣ*. Сѣвернѣе — въ *Петровскомѣ* — *Шагаровкѣ*, *Злыдиной*, *Мѣловомѣ* — мергеля и фосфориты.

2) На югѣ, въ 13 верстахъ отъ *Калиновки* — лежитъ *Неплюевка* на р. *Клевени*. Въ ней *бѣлый мѣлѣ*, прикрытый зеленовато-сѣрыми песками. Въ *Борщовкѣ* пески съ песчаникомъ. Въ *Ольховкѣ* голубыя глины. Въ *Кожановкѣ* и *Злобиной* подъ песками сѣроватые мѣловые рухляки.

3) Съ запада прилегаютъ только что описанныя верховья рѣкъ *Свѣти* и *Ивота* (*Чуйковка*, *Никитовка*, *Смокаревка*). (Они подходятъ къ верховьямъ рѣкъ *Немеды* и *Липницы*). Здѣсь мы видѣли сильное развитіе зеленовато-сѣрыхъ песковъ съ подлежающимъ въ глубинѣ мѣломъ.

Такимъ образомъ устанавливается слѣдующая общая послѣдовательность слоевъ. Съ востока (отъ *Свапы*) на западъ фосфориты, покрытые мергелями и мѣломъ, смѣняются надмѣловыми рухляками и наконецъ зеленоватыми песками, которые господствуютъ въ Черниговской губерніи. То есть съ В. на З. мы имѣемъ *восходящую послѣдовательность пластовъ*.¹⁾

Село Гламаздино-Гремячее. Подъ покровомъ тонкихъ лёссовидныхъ суглинковъ, въ верхней части песчанистыхъ, лежатъ бурья глины, потомъ темно-бурые щебенистые суглинки, весьма плотные; подъ ними перебитые — а затѣмъ и плотные *иноцерамовые рухляки*. (Высота мѣстности 106 саж. и въ *Чубаровкѣ* и *Кириновкѣ* тоже 106).

Выходы села *Гламаздина* находятся въ полномъ соотвѣтствіи съ выходами *Злобиной* и *Чубаровки*; но только въ *Гламаздинѣ* сильно выражены аллювіальные наносы. Интересно подчеркнуть то обстоятельство, что здѣсь типичнаго *лѣсса нѣтъ*, хотя высота мѣстности 106 саж. Я объясняю его отсутствіе тѣмъ, что мѣстность эта слабоволнистая — не имѣетъ очень крутыхъ склоновъ.

Въ *Селинѣ* слабо развитый *лѣссъ*, а подъ нимъ *зеленоватострая глина*, подходящая къ *опокѣ*. (Подобныя глины на мергеляхъ южной части *Кромскаго у.*). (Высота 107 саж.). (52° и

1) См. Разр. № 6 на поляхъ Геол. Карты.