

Къ сѣверу отъ *Роговки* въ 1 в., берега Десны представляютъ рядъ отвѣсныхъ мѣловыхъ утесовъ надъ уровнемъ Десны, высотой до 100'. Здѣсь многочисленные глубокіе, обнаженные овраги съ прекрасными разрѣзами.

1. Грязножелтый суглинокъ съ тонкими прослоями чернобурой вязкой глины 4 ф.
2. Желтоватый мелкозернистый песокъ съ прослоями желто-бураго крупнаго песку 3 ф.
3. Оранжево-желтый суглинокъ, содерж. въ незначительномъ количествѣ мелкій гравій 7 ф.
4. Желто-бурый и красно-бурый валунный суглинокъ, съ прослоями валуннаго песку 20 ф.
5. Свѣтло-желтый съ охристыми пятнами известково-песчаный суглинокъ, съ мергельн. сростками 6'.
6. Бурая вязкая глина; съ прослоями сѣрой и съ значительнымъ количествомъ крупныхъ зеренъ кварца 14 ф.
7. Охристо-желтый, сѣрый и зеленоватый слоистые пески 16 ф.
8. Сѣрый глинистый мергель 6 ф.
9. Довольно твердый мѣлъ бѣлый, трещиноватый и раздѣленный на слои до 3'. Вся толща 100'. Въ верхней части кремни, чернаго цвѣта.

Кремни то желваками, то прослоями въ 2" толщины.

На глубинѣ отъ 35 до 65 ф. отъ верхней поверхности *мѣла*, въ немъ лежатъ 2 прослоя глауконитоваго мѣла, до 10' каждый.

Второй нижній прослой особенно богатъ примѣсями зер. кварца, глауконита, слюды, такъ что мѣстами переходитъ въ глауконитовый песокъ. Въ немъ буроватые фосфоритные сростки и много окаменѣлыхъ губокъ. Различные *Ventriculites*, *Spond. spinosus*, *Pecten splendens* Log.; Bell. mucr.

---

Нѣсколько сѣвернѣе рѣки *Усожи*, въ Шаровской волости пробѣгаетъ ручей *Бобрискъ*, начинающійся въ *Козловкѣ*, при 116 с. и впадающій въ *Неруссу* на шир. 52°30' и 4°11'. Въ *Трасной* залегаютъ пески съ песчаникомъ. А именно: подъ крупнымъ краснымъ пескомъ (гравіемъ) лежатъ слабо-гли-