

лый мѣлъ. 3) Въ *Башикировой* выходы постпліоценовыхъ отложений съ остатками мамонта и носорога (стр. 28—29). Подъ ними выходитъ *синій глей*, т. е. очень плотныя жирныя глины, вѣроятно третичныя. Къ рѣшенію спорнаго вопроса находимъ точное указаніе у г. *Романовскаго*. Онъ для селъ *Мыцкаго* и *Яшинаго* указываетъ выходы *бѣлаго мѣла*. Это вполне соотвѣтствуетъ высотѣ мѣстности. Въ *Яшиномѣ* 119 саж. Въ *Шаховцахѣ* 121. Въ *Мыцкомѣ* 119 саж. Это подтверд. бур. изслѣдов. 1891 г.

Поэтому, на основаніи вышеприведенныхъ данныхъ можно сказать, что рѣка *Навля* у истоковъ окружена мѣловыми толщами, прикрытыми третичными темносиними глинами (проблематично); выше слѣдуютъ четвертичныя отложенія — поледниковыя и типичный лессъ.

*По рѣкѣ Робкѣ, притоку р. Водочи.*

Выходы селъ *Робье*, *Титово* и *Бычанецъ* — дополняютъ намъ только что приведенное указаніе. Тѣмъ болѣе, что мѣстности эти, вмѣстѣ съ *Лабковскимъ* ручьемъ, вплотную прилегаютъ къ западной изслѣдованной полосѣ *Кромскаго уѣзда*.

Выше села *Робье*, по ручью *Хаткѣ*, подъ лессомъ лежатъ 1) голубовато-сѣрая глина до 2 метр., 2) ниже идетъ жирная голубая глина, 3) ихъ раздѣляетъ прослой песка, покрытый желваками фосфорита, перемежанными съ осколками песчаника; толща прослоя до 4 децим. Вѣроятно, эта нижняя жирная ярко-голубая глина аналогична тѣмъ глинамъ *Глуховскаго у.*, которыя сопровождаютъ третичные пески и песчаники. Въ восточныхъ оврагахъ *Робьей* ломается на глубинѣ мѣлъ. Въ *Титовой* главнымъ образомъ развиты только торфяники, а въ *Бычанцѣ*, въ основаніи овраговъ, выходитъ таже сѣро-голубая глина, — но съ сферосидеритомъ; на нее налегаютъ охряные пески — иногда слоистые. (См. М. О., стр. 324 и 34—35).

*Лабковскій ручей и рѣка Водоча.*

Въ деревнѣ *Ланки* выходитъ *бѣлый мѣлъ* въ оврагахъ; въ оврагахъ, тянущихся къ *Работьковой* выходятъ *глинистые мергеля*. Въ самой *Работьковой* и сосѣднихъ оврагахъ также выходятъ подобные сѣроватыя тонкоплитчатые, слегка слюдистые глинистые мергеля (иноцерамовые). *Работьково* окру-