

возвышенная (у Березовки), послѣдовательно и быстро падаетъ къ сѣверу, отъ 125—126 саж. чрезъ 114 до 102.

Восточная полоса, прилегающая къ Кромскому уѣзду, наиболѣе возвышенная и постоянная; отъ высотъ *Работьковой* около 126—127, на югѣ, холмы падаютъ къ сѣверу до 120 у *Робьей*.

Краткій геологическій обзоръ.

Поэтому общая картина геологическаго строенія описанныхъ южныхъ притоковъ р. *Навли* будетъ слѣдующая.

Подъ значительными толщами типичнаго лесса съ дутиками, залегаютъ, на западѣ, новѣйшія аллювіальныя глины, распадающіяся на два яруса;—верхній—темно-бурые суглинки, часто слоистые и очень песчанистые; ниже кофейная жирная глина, сплошная и плотная. Въ ней ни гравія, ни галекъ, ни валуновъ.

Восточнѣе толщи этихъ двухъ глинъ исчезаютъ и онѣ замѣняются тонкимъ слоемъ обычныхъ бурыхъ глинъ или суглинковъ, подстилающихъ лессъ. Далѣе слѣдуетъ свита буроватыхъ наверху, потомъ слоистыхъ бѣлыхъ, сѣрыхъ, голубоватыхъ и зеленоватыхъ песковъ, тонкаго зерна, заключающихъ въ верхнихъ горизонтахъ плотные песчаники. Проблематичныя — третичныя образованія (Дрынки, Городецъ, Климово, Щепятино, Березовка, Бычанецъ и Рабье).

Ниже идетъ *стро-голубая* свѣтлая и жирная глина весьма явственно развитая отъ самыхъ границъ Кромскаго у., начиная, на западъ чрезъ Бычанецъ, Волкову и Одоцкое къ западу—Климово и къ югу Лапки. Глина эта лежитъ высоко. Присутствіемъ этой голубой глины объясняется сильное развитіе въ этой области торфяниковъ. Ниже слѣдуютъ надмѣловые рухляки (Работьково) и мѣль (на 97—98 саж.). *Пласты фосфоритовъ здѣсь нигдѣ не показываются* (хотя разрѣзы проходятъ отъ 127 до 93 саж.). См. въ текстѣ I части описаніе Хотькова и Юшкова (стр. 355—358).

Въ дополненіе къ указанному можно привести еще свѣдѣнія о бассейнѣ рѣки *Подлавы*, которая, сливаясь съ Пересонкой, образуетъ рѣку *Лапузню*, впадающую въ р. *Навлю* около *Себяки* (4°19').