

Въ *Соколовкѣ* ($4^{\circ} 20'$), при высотѣ 102 с., въ окрестныхъ рытвинахъ выходы бурыхъ суглинковъ и жесткихъ бур. глинъ.

Въ *Калиновкѣ*, *Бяковѣ*, *Семицѣ* и *селѣ Никольскомѣ*, расположенныхъ по ручью *Жидовкѣ*, при высотахъ 100—103, подъ незначительнымъ слоемъ сѣрыхъ глинъ залегаютъ надмѣловые рухляки, весьма глинистые и слабо-слюдистые.

Въ южной части имѣнія г-жи *Зиновьевой* залегаетъ весьма плотный жирный торфъ, переходящій къ лигнитамъ (см. анализъ въ приложеніяхъ).

Въ *Святомѣ* ($4^{\circ} 3'$) при выс. 100 с. выходятъ надмѣловые рухляки въ нѣсколькихъ обрывахъ; подъ ними слѣдуетъ бѣлый типич. мѣл. Тоже самое въ *Салтановкѣ* и *Глинномѣ* ($3^{\circ} 50'$).

Обширныя пространства земель къ сѣверу отъ Навли по 4° меридіану заняты обширными лѣсами и часто болотами особенно у р. *Ревны* и *Харпача*, а потому эта мѣстность неудобна для изслѣдованія.

Система рѣки Ревны.

Рѣка Ревна начинается двумя истоками подъ меридіаномъ $4^{\circ} 30'$ и 53° широты, около дер. *Ревны* и *Власовки*. Протекаетъ сперва по обширному торфяному болоту, гдѣ пополнившись водою многочисленныхъ ключей, находящихся преимущественно на правой окраинѣ этого болота, направляется къ ЮЗ, начиная отъ *Колцова* и недоходя села *Бутря*, скрывается подъ наплывами; отъ чего образовалась въ этомъ мѣстѣ непроходимая трясина, на которой попадаются такъ называемые «окна», непомѣрной глубины. Потомъ рѣка эта, недоходя до деревни *Прильпы*, выходитъ изъ подъ наплывей наружу, протекаетъ по лѣсистой мѣстности Карачевского уѣзда заходитъ въ Трубчевскій уѣздъ и пройдя по ЮВ. части его 25 верстъ, впадаетъ въ Десну. Рѣка эта становится сплавной — только между селомъ *Ревной*, и самымъ устьемъ. По ней сплавляется лѣсъ (см. Орловскія Губ. Вѣд. 1864 года № 42. *Медико-топографическое описаніе Орловской губ.*, стр. 437). Сообразно съ этими физико-географическими данными о теченіи рѣки Ревны, мы не въ правѣ ожидать отъ нея большаго геологическаго матерьяла, вслѣдствіе болотистости и заплывей большей части ея теченія.