

сюда же принадлежатъ и глины селенія *Хотни*; какъ это будетъ понятно изъ послѣдующаго.

«Залежи фосфоритовъ, кромѣ *Карачижской* горы у Брянска, «Тарачкову удалось видѣть въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) Въ «селѣ *Дарковичахъ* 20 верстъ отъ Брянска, близъ деревни *Калячиной*, 2) на пространствѣ между селомъ *Бацкимъ* и деревни «*Касилово* и *Сельцомъ* по р. *Вѣтьмѣ*, 3) а въ сѣверной части «Брянскаго уѣзда Тарачковъ находилъ фосфориты, въ буровыхъ «скважинахъ, между деревнями *Немерицями* на р. *Вѣтьмѣ*, *Будой* на р. *Снопоти* и *Хотней*. 4) Въ СЗ. части уѣзда наблюдаемы были двѣ параллельныя прослойки фосфорита на лѣвомъ берегу р. *Десны*, въ недалекомъ разстояніи отъ *Хотьмировой* — близъ р. *Десны* недалеко отъ устья въ *Снопоти*).

По Романовскому. Въ сѣверной части *Брянскаго уѣзда* развита главнымъ образомъ *мѣловая формация*, изъ подъ которой рѣдко показывается *юрская*, но вѣроятно на глубинѣ продолжается нижняя каменно-угольная формация — явственно выраженная въ смежномъ *Жиздринскомъ уѣздѣ* *Калужской губерніи*. Такъ напримѣръ въ берегахъ рѣки *Болвы*, есть хорошія обнаженія около села *Погостъ* (4° и 54°), гдѣ слои горнаго известняка заключаютъ въ изобиліи *Productus gigas*. (см. *Романовскій*, стр. 398). («*Погостъ*» отъ *Рубчи* отстоитъ всего на 22 версты).

На основаніи своихъ детальныхъ изысканій *Романовскій* предлагаетъ такой сводный разрѣзъ, — проходящій съ села *Погостъ*, чрезъ *Манину* на *Колчину*, *Рубчу* и *Бытошевскій заводъ*.

*Восходящій порядокъ:*

1. *Каменноугольный известнякъ* съ *Prod. Gigas*.
2. *Синевато-сырая* сланцеватая глина съ тонкими прослойками каменнаго угля.
3. *Желѣзистые* и *зеленоватые* пески съ зернами черновато-зеленаго песчаника *мѣловой почвы* (доказано-ли?)

*Г. Романовскій* говоритъ, (стр. 399) что въ «сѣверной части *Брянскаго уѣзда* *Тарачковъ* провелъ нѣсколько буровыхъ скважинъ, изъ какихъ одна — 35 аршинъ глубины, заложена около д. *Хотни*, въ 5 верстахъ отъ д. *Рубчи* показала на 33—35 арш.