

черные мѣловые пески съ *галышевымъ песчаникомъ* (фосфоритомъ?) подобнымъ мѣловому Брянскому.

Между Десною и Снопотью также есть надежда на каменный уголь. Но въ этой мѣстности на поверхность выступаютъ мѣловые рухляки и мѣль. (См. статью автора въ XIV томѣ Мат. Геологіи Россіи).

«На правомъ берегу рѣки *Болвы*, у перевоза — недоѣзжая «села *Сукремля* (къ югу отъ *Людинова*) подъ наносомъ съ эрратическимъ щебнемъ, обнажается синевато-желтая глина, съ «пластомъ ноздреватой желѣзной руды, одинаковой съ рудою «села *Копаль* на *Деснѣ*, подъ которою лежитъ липкая голубовато-«сѣрая глина.

«Къ сѣверо западу и сѣверу отъ *Брянска* мѣль и мѣловой рухлякъ обнажаются по правому берегу р. *Десны* около дер. Глинщева, с. Кобылича, Овстучь, д. Угость, Гостиловки и Вышковичи. (Послѣднія двѣ близъ впаденія р. *Вѣтмы*, а предыд. вдоль почтовой дороги и рѣки).

Село «*Копаль*», расположенное значительно сѣвернѣе предыдущихъ, близъ впаденія р. *Снопоти* въ *Десну*, на лѣвомъ берегу послѣдней, имѣетъ интересъ по слѣдующему разрѣзу:

1. Мѣловой рухлякъ съ *Belemnitella mucronata*.

2. Зеленовато-сѣрый песокъ около 20', заключающій пропластокъ кругляковъ и зерна темно-зеленаго песчаника (фосфорита).

«Внизъ по рѣкѣ въ 2 вер. отъ обнаженія, находятся подъ «наносомъ толстые сплошные пласты ноздреватой песчаной желѣзной руды (с. 406).

«По теченію рѣкъ Брянскаго уѣзда—*Вѣтмы*, *Хотни* и *Бытоша* (всѣ на сѣв. границѣ съ Калужской губ.) — между селеніями *Несковищи*, *Фошней*, *Любегощъ*, *Сельцо*, *Бытошъ*, *Немеричи*, *Буда*, *Хотня*, *Рубча* и *Колчино*, развиты зеленоватые пески съ валунами и зернами мѣловаго черновато-зеленаго песчаника, подобнаго Брянскому (т. е. фосфориту)».

«Изъ села *Бытошъ*, проѣхавъ на *Крынки*, *Сукремель* и *Людиново*, г. Романовскій вновь спустился къ югу до *Любахны* по «шоссе. Оказалось, что здѣсь залегаютъ также мѣль и мѣловые «песчаники. Такъ, на примѣръ, близъ деревни *Куявы*, у р. *Болвы*,