

«на широтѣ *Жиздры*, встрѣченъ плотный звонкій свѣтло-зеленый «песчаникъ съ раковистымъ изломомъ, явственными зернами и «черными стеблевидными отпечатками. Между *Куявой* и *Дятково-вымъ*, на 15-ой верстѣ отъ *Людинова*, находится бѣлый мѣлъ, а «по дорогѣ отъ *Дяткова* до *Любахны* находятся мѣстами ямы, «гдѣ виденъ мѣлъ и песокъ съ зернами песчаника. (Всѣ эти мѣ- «стности лежатъ вдоль нижняго теченія рѣки *Болвы*)». (Романов-скій 1. с. 407). ¹⁾

Въ Любахнѣ Г. Романовскій видѣлъ отбросъ изъ каменно-угольной шахты—юрскихъ черныхъ глинъ съ обломками грифей и беллемнитовъ.

Полный разрѣзъ, проведенный Г. Романовскимъ съ *Маклаковъ* на *Брянскъ*, для меня чрезвычайно важенъ и является въ слѣдующемъ видѣ:

- | | | |
|---------|---|--|
| | а. Наносъ. | |
| Мѣловая | { | б. Мѣловой рухлякъ. |
| | | в. Бѣлый мѣлъ. |
| | | г. Зеленый песчаникъ и песокъ. |
| | | е. Охристыя глины съ бурымъ желѣзнякомъ. |
| | ф. Каменноугольный или горный известнякъ нижняго яруса. | |
| | г. Сланцеватыя глины съ каменнымъ углемъ. | |

Наконецъ, на пространствѣ между деревнями и селами Хоть-мировой (у Десны), Бутчино, Желтухи, Савки и до Песочинскаго завода на *Болвѣ* раскинуты «глинистые слои *третичнаго періода*». Къ нимъ Романовскій относитъ.

1. Мясо-красныя рухляковыя глины съ зелеными прослойками, (Подъ ними напримѣръ на Песочинскомъ Заводѣ лежатъ слои слюдистой сѣровато-бѣлой огнепостоянной глины; а подъ ней горн. изв.).

2. Синеватые, желтоватые и бѣлые слюдистые пески, кое-гдѣ перемежающіеся съ мясо-красными и зеленоватыми глинами,

1) См. подробнѣе въ книгѣ автора Бассейнъ Десны и Жиздры и въ 14 томѣ Матер. по Геол. Россіи.