

ловки въ Десну, подлѣ пристани *Мошечье*, мы встрѣтили опять обнаженія мѣла и внизу его подлѣ самой воды—множество, вымытыхъ вѣроятно водой, *кругляковъ фосфорита*. У *Мошечья* кругляки саморода совершенно особаго вида, какихъ мы нигдѣ не встрѣчали; они представляются въ видѣ довольно толстыхъ цилиндрическихъ палокъ, или отдѣльныхъ, или сросшихся подъ различными углами въ рогульки разнообразной формы. Они черные и песчанистые.

Въ верстахъ 30 къ сѣверу отъ *Угостинской* поч. ст. расположено село *Вороново*, на правой сторонѣ рѣки *Десны* и на берегу р. *Габьи*.

Здѣсь также есть обнаженія, которыя авторъ описываетъ такъ: «*Габья* течетъ по широкому логу, берега котораго состоятъ изъ *мѣловыхъ возвышенностей*. На возвышенности лѣваго берега стоятъ усадебныя постройки гг. Мальцева, Сикстеля и др. Верхъ возвышенности состоитъ изъ *мѣла*, который обнажается подъ усадьбой *Мальцева*. Въ нижнихъ частяхъ мѣла разсѣянно попадаются мелкіе черные кругляки саморода. Въ обнаженіи подъ усадьбой *Сикстеля* видѣнъ внизу подъ *мѣломъ*, *стырый песокъ*, въ которомъ идетъ слой *кругляковъ саморода*. Въ нихъ фосфор. кислоты 21%.

Еще былъ найденъ самородъ въ *Жуковѣ*, въ обнаженіи праваго берега *Десны*.

«Часть *Брянскаго уѣзда*, лежащая по лѣвой сторонѣ р. *Десны*, представляетъ покрытую мѣстами песчаную равнину, пересѣченную небольшими куполообразными *мѣловыми возвышенностями*. Во всѣхъ логахъ и лощинахъ, къ которымъ текутъ многочисленныя рѣчки, вливающіяся въ *Десну* или въ притоки—*Болву*, *Вѣтму* и др.,—на поверхность выходятъ пески, въ котор. на незначительной глубинѣ залегаютъ слои *кругляковъ саморода*, который здѣсь то по преимуществу добывался для *Брянско-Рославскаго шоссе* и добывается теперь для *Мальцевскихъ шоссе*» (с. 42).

По лѣвой сторонѣ р. *Десны* мы осмотрѣли залежи саморода подлѣ *Чайковичъ*, *Дарковичей*, *Соколова*, *Липова* и *Любахны*.

«Добыча саморода у *Чайковичъ* у 4° производилось въ боль-