

3. Желто-бурый и сѣрый валунный суглинокъ съ бол. ч.
крупн. валуновъ 20 ф.
4. Бѣлый крупно-зернистый песокъ содержитъ куски гли-
нистаго мергеля 15 »

Глубже въ дол. р. *Косты* обнар. слѣды глин. мергеля.

Въ окрестностяхъ *Млина*, по р. *Кокоту*, впадающей въ *Судынку*, — такіе выходы; подъ лессомъ и валунными суглинками лежатъ — буро-черная, желто-сѣрая и желтая *горшечная глина*, а глубже сѣро-бѣлый и желтый глинистый песокъ.

По р. *Воропусь*, въ сел. *Велюханахъ* (къ западу отъ *Акуличей* Бр. у. и къ югу отъ ст. *Николаевской*) выходитъ мѣловой мергель, прикрытый лессомъ.

По р. *Судынкъ*, притоку р. *Ипуть*, въ окрест. села *Негитовки* тоже, что по р. *Кокоту*.

Близъ *Шевердъ* и *Костиничей* сѣрый мергель покрывается зелеными песками, а потомъ ледниковыми образ. и лессомъ.

По р. *Войловкѣ*. Къ востоку отъ *Осколкова*, т. е. къ югу отъ *Строительной Слободы* и *Акуличей* на границѣ Брянск. у. подъ валуннымъ суглинкомъ сѣраго цвѣта, лежатъ сѣровато-бѣлые мелкозернистые, сильно слоистые пески, мощность которыхъ достигаетъ 20 ф. (см. *Армашевского сел.* 85).

Наконецъ можно прибавить ко всѣмъ этимъ литературнымъ даннымъ, еще и то, что юрская оксфордская нижняя или келловейская глина, констатированная уже въ *Любахнѣ*, *Брянскѣ*, лѣтомъ 87 г. была мною наблюдаема еще въ окрестностяхъ железнодорож. ст. *Ивановской*, а именно близъ села *Несонова*, гдѣ *in situ* изъ темно-сѣрой, почти черной глины, добыта только одна крупная *Gryphaea dilatata*.

Краткій обзоръ геологическаго строенія части Брянскаго уѣзда,

(лежащей между широт. $53^{\circ}15$ и 54° или къ сѣв. отъ Брянска).

Сюда относятся системы рѣки *Десны* и ея притоковъ—*Болвы*, *Вѣтмы*, *Стѣнной*, *Ржаницы*, *Бытоша*, *Серижи*, *Волыни* и *Уюсти*.