

перемытыми зернами глинистаго рухляка и слюды и совер. обкатанными беллемнитами. Выше все затянато растительностью.

Въ сосѣднихъ оврагахъ *Чен. М.* разрѣзы лесса до 7 м., а подъ нимъ или перемытые рухляки или элювій глинистаго рухляка.

Любовна ($52^{\circ}33'$) на рѣкѣ *Ужъ*.

Въ овр. лессъ; подъ нимъ бѣловатая—голубов. глина—элювій глинистаго рухляка. Въ другихъ мѣст. сѣрыя новѣйшія глины, покрытыя бурыми суглинками. Еще глубже лежатъ *гончарныя глины* подъ покровомъ *сѣро-голубой глины*. Онѣ бываютъ здѣсь двухъ цвѣтовъ.—Первыя съ большей глубины (свыше 3 саж.)—*синеватыя* лучшаго качества. Вторыя *желтосѣрыя* съ глубины 2 саж. За доставку воза глины плотится 50 коп. Нѣсколько выше въ *Сосновкѣ* такія же горшечныя глины, но высшаго качества и цвѣтовъ — *сиренево сѣраго* и *фіолетоваго*.

Въ *Емельяновкѣ* и *Борщинѣ* подъ бурыми глинами выступаютъ снова перемытые глинистые рухляки съ обломанными и обкатанными беллемнитами. Въ *Грудовцахъ* появляются слоистые пески. *Вилки* — выходы перемытаго рухляка; тоже и въ *Карташовкѣ*.

Въ дер. *Чмыховой* выступаютъ горшечныя бланжевыя глины, покрытыя такими же суглинками.

Въ 18 верстахъ къ западу отъ *Сосновки* на *Ужъ* лежитъ *М. Погаръ* на р. *Судости*. Сравнимъ ихъ выходы.

Въ окрестностяхъ *Погара*, въ обнаженіяхъ, наблюдается лессъ и валунныя образованія. Эти послѣднія состоятъ изъ *желто-бураго* и сѣраго валуннаго *суглинка* и прикрываются перемежающимися слоями желтоватаго песку и бураго рыхлаго суглинка. Въ береговыхъ обнаженіяхъ (*Судости*) валунный суглинокъ покрытъ лёссомъ въ 25 футъ. Ниже выходовъ нѣтъ (см. *Армашевскій*, стр. 42).

Изъ этого мы заключаемъ, что *валунныя образованія*, такъ хорошо выраженные за *Судостью*, не переходятъ восточнѣе этой рѣки.

Такъ какъ болѣе глубокіе слои остались здѣсь скрыты, возъ-