

Мансуровки, Ивановскаго, Юрова и др., дѣйствительно, мы находимъ сильное развитіе лёсса, который къ низинамъ быстро смѣняется плавучей красной глиной. Лёссъ продолжается еще немного далѣе *Трубчевска*. Но въ области къ западу отъ рѣки *Конани* слѣдуетъ полоса сильнаго развитія аллювіальныхъ наносовъ различнаго характера. Здѣсь продолжаются постоянные выходы тѣхъ же рухляковъ, но поверхность ихъ покрыта наносомъ изъ перемытой породы того же характера, затѣмъ спорадически развиты третичные пески, какъ это было уже указано. Особенно выдѣляется здѣсь рѣзкое проявленіе *горшечныхъ пестрыхъ глинъ* въ бассейнѣ рѣки *Ужй*. Эти глины всегда сопутствуютъ въ Курской и Черниговской губерніи валуннымъ рухляковымъ глинамъ и суглинкамъ, подлегая подъ ними. Лучшія изъ этихъ глинъ сиренево-сѣраго цвѣта.

Покровный слой здѣсь иногда является въ формѣ щебенистыхъ плотныхъ бурыхъ глинъ, значительнаго удѣльнаго вѣса.

Черноземъ развитъ въ этой области по меридіану $3^{\circ} 40'$, къ югу отъ *Мансуровки* и вплоть до *Радутина*.

Все сказанное о южной полосѣ Трубчевскаго уѣзда, заключенной между широтами $52^{\circ} 52'$ и $52^{\circ} 30'$ (къ востоку отъ 3° мерд.) можно выразить слѣдующимъ схематическимъ разрѣзомъ.

1. Лёссъ. — 6 — 10 м.
 2. Красная плавучая глина. }
 3. Бурая глина щебенистая. } 3 — 4.
 4. Горшечныя пестрыя глины. 2 м.
 5. Слоистые пески бѣлаго и сѣраго цвѣтовъ, рѣдко съ песчаниками. 6 — 8 и до 20 м.
 6. Глинистые рухляки.
- Мѣла нигдѣ нѣтъ.

Нельзя здѣсь не указать факта, любопытнаго въ стратиграфическомъ отношеніи, находки г. Армашевскимъ выходовъ *мѣла* бѣлаго, нѣжнаго, съ многочисленными окаменѣlostями, напр. съ *Spondylus Spinusus*, не только въ долину р. Судости, но еще за-