


кремнистаго песчаника высоко поднимаются до *Пасерковой*, гдѣ несогласно пластуются съ фосфоритовой плитой. Въ нихъ находимъ окаменѣлые стволы деревьевъ, древесина которыхъ въ точности неопредѣлима (по *Шмаллаузену*), но приближается къ роду *Cupressinoxylon*.

XXII. По рѣкѣ *Песочинѣ* подобные выходы указаны у меня для Андросова, Макарова и Зориной, разрѣзы которой представлены на рисункѣ, и на первый взглядъ являются весьма простыми; но въ дѣйствительности — представляютъ соединенные выходы сеномана и (эоцена) проблематичнаго яруса.



Несоотвѣстное пластованіе третичныхъ слоевъ съ песчаникомъ, относит. фосфоритныхъ песковъ.

Тоже самое одинаково относится къ рѣчкѣ *Копенкѣ* и *Радубичамъ*, плотные сливные песчаники которыхъ имѣютъ растительные остатки. (Подробности см. текстъ I части). Здѣсь развить только одинъ верхній ярусъ, какъ это можно заключить по хорошо выраженнымъ — покровнымъ желѣзистымъ пескамъ и песчаникамъ; а также и по характеру самаго песчаника — который является плотнымъ и крупнозернистымъ (сахаристымъ), но никакъ не глинистымъ. Остатки особенно изобильны именно тамъ, гдѣ песчаникъ является наиболее слабо-цементированнымъ.

XXIII. Въ бассейнѣ нижней *Усожи* около Бузца, Троицкаго, Сучковъ, и восточнѣе, въ извѣстныхъ *Малотычахъ* выступаетъ