


также верхній ярусъ. Растительные остатки села Молотычи состоятъ въ отпечаткахъ листьевъ, которые изображены еще у Борисяка и опредѣлены какъ *Darhnogene magnoliaefolia* Eichw. *Darhnogene coriacea*, Eichw. Найденные мною отпечатки листьевъ подходятъ къ *Darh. coriacea*.

XXIV. Два небольшихъ островка третичныхъ отожений, найденные и опредѣленные Романовскимъ, лежатъ у самыхъ Кромъ и стали извѣстны въ литературѣ подъ именемъ *Ажовинскихъ* (пригородъ Ожево).

Разрѣзъ такого вида: 1) Желтый песокъ съ желѣзистымъ песчаникомъ. 2) Зеленовато-желтый песокъ и рыхлый песчаникъ. 3) Бѣлый песокъ и рыхлый песчаникъ. 4) Зеленоватобѣлый рухлякъ. Подобные выходы еще извѣстны въ Калчевой, Никольскомъ, Ретяхахъ Мокѣевой и др.

Восточнѣе я наблюдалъ ихъ за р. *Рыбницей* у Глѣбовой, у ст. Зміевки, въ *Упаломѣ*—гдѣ особенно хорошо выраженъ верхній ярусъ, — состоящій изъ большой толщи охристыхъ и желтыхъ песковъ, съ подчиненными досчатыми тонкими плитами же-

Окрестности ст. Ж. Д. ЗМІЕВКИ.



лѣзистаго песчаника; съ глыбами ниже лежащаго песчанистаго бураго желѣзняка; на границѣ съ свитою бѣлыхъ песковъ, — которые спускаются до дна — залегаютъ плотные жерновые песча-