

песчанистыя глины—напр. Сукремль, Барсуки до Кузьминичей, Людиново, Крынки и Колчино и много др. По картѣ Романовскаго подобныя третичныя отложенія отъ р. Снопоти продолжаются на СВ—рѣзко выраженнымъ языковиднымъ лоскутомъ,—проходящимъ чрезъ верховье р. *Болвы* и далѣе на *Юхновъ*.

Другая узкая полоска на его картѣ, проведенная со ст. *Хотынецъ* чрезъ Нугрь на ст. *Урино*, совершенно согласуется съ моими наблюденіями, такъ какъ *Урино* лежитъ невдалекѣ отъ *Ждиміра*.

---

Я счелъ нужнымъ такъ подробно остановиться на проблематично-эоценовыхъ отложеніяхъ описываемаго мною района особенно потому, что почти нигдѣ не имѣлось прочныхъ основаній для причисленія тѣхъ или другихъ выходовъ къ данному ярусу. Поэтому я не только подробно перебралъ здѣсь всѣ отдѣльные лоскутовидные выходы ихъ, но по возможности и обосновалъ опредѣленія возраста указаніями на аналогичные выходы — или же на чисто-стратиграфическія отношенія.

Теперь, покончивъ съ очеркомъ общаго распространенія описываемаго яруса, я перейду къ указанію наиболѣе типичныхъ мѣстъ развитія отдѣльных его слоевъ; затѣмъ выведу общій складъ всей свиты этой песчаноглинистой группы и укажу нѣкоторыя особенности ея.

Въ геологическомъ строеніи береговъ *Псла* и его притоковъ принимаютъ участіе слѣдующіе, естественно выдѣляющіеся, ярусы:

1. Черноземъ.
2. Диллювіал. глины съ крист. валунами.
3. Полосатыя и разноцвѣтныя *глины-глиныя*, заключающія въ себѣ шток *инса*
4. Желтый и бѣлый кварцевые пески, служащіе мѣстонахожденіемъ желѣзистаго песчаника.
5. Зеленоватые пески — содержащіе въ себѣ роговиковый песчаникъ.