

«замѣтно переходитъ въ горизонтальномъ направленіи въ *типичный лессъ*». (Тоже самое *ibidem* на стр. 14 въ двухъ мѣстахъ).

Но особенно замѣчательно слѣдующее мѣсто въ книгѣ г. *Армашевскаго*, (стр. 15).

«Кромѣ перечисленныхъ породъ въ окрестностяхъ *Роговки*, во многихъ мѣстахъ наблюдаются обнаженія лесса, залегающаго на различныхъ уровняхъ пологихъ склоновъ овраговъ, а также составляющаго иногда верхнюю породу здѣшнихъ береговыхъ обнаженій. Но въ разрывахъ, проходящихъ чрезъ болѣе высокіе пункты мѣстности онъ положительно отсутствуетъ, въ чемъ я убѣдился, изслѣдовавши огромное число обнаженій на крутыхъ склонахъ боковыхъ овраговъ, значительно вдающихся въ береговую возвышенность».

Такіе факты у автора весьма многочисленны, и напр. на стр. 39, 42 и 43, повторяются съ подробными объясненіями напр. такого характера: въ оврагѣ *Городокъ* ясно видны переходы сѣровато-желтаго слегка известковаго супеска съ мергельными сростками въ *типическій лессъ*, лежащій у самаго устья. Толща лесса 25 ф.

(На стр. 59). «Относительно распространенія лесса (по теч. *Снова*) вполне констатированъ тотъ фактъ, что этотъ осадокъ находится въ мѣстностяхъ болѣе или менѣе холмистыхъ, покрытыхъ оврагами (?! слѣдствіе за причину), тогда какъ въ мѣстностяхъ ровныхъ, слабо размытыхъ, онъ отсутствуетъ».

Мои наблюденія, относящіяся къ залеганію лесса въ зависимости отъ опредѣленнаго строенія мѣстности, привели меня къ совершенно яснымъ выводамъ, которые были мною сообщены уже въ 1883 году (въ засѣд. *Общ. Естеств.* 8 Декабря. См. *Труды*. — Томъ XIV стр. 111).

Многочисленные наблюденія надъ залеганіемъ лесса въ той же области, сдѣланныя мною съ 1881 по 88 г. (число наблюденій свыше 300) — привели меня къ подтвержденію тѣхъ же положеній, которая были мною высказаны въ упомянутой статьѣ.

Главный тезисъ мой таковъ: *существуетъ совершенно опре-*