

угольнике, образованном станциями Любичкое, сах. завод Спартак и Обоянь.

6. Годовой ход осадков. Представление о годовом ходе дается таблицей 12, где приводятся средние месячные суммы осадков. Наименьшее количество осадков почти везде по округу выпадает в феврале. В следующие месяцы количество выпадающих осадков возрастает. В меньшей юго-западной половине округа (Курский, Медвенский и Обоянский районы) максимум осадков приходится на июнь месяц. В остальных районах округа максимум осадков падает на июль.

В августе среднее количество выпадающих осадков уменьшается и в сентябре в южных и юго-восточных районах округа (Курский, Медвенский, Обоянский, Тимской, Солищевский) наблюдается второй минимум осадков; в октябре там же второй незначительный максимум, после которого почти везде, за исключением Курска и Алисово, идет убывание осадков до февраля. Таков средний годовой ход осадков по округу.

В действительности же наблюдаются значительные отклонения от него. Были взяты наблюдения станций Курск и Богородицкое-Фенино, станций с большим периодом наблюдений и установлены месячные минимумы и максимумы осадков за каждый год. Оказалось, что в Курске за 35 лет месячный максимум осадков ни разу не падал на февраль, март и апрель, точно также как минимум ни разу не наблюдался в июле и августе. Большею частью максимум осадков в году падал или на июнь (20%), или на июль (37%). Минимум осадков в году наблюдался или в сентябре (20%) или же в феврале или в марте (17%).

В Богородицком-Фенино за 39 лет месячный максимум осадков в году ни разу не наблюдался в феврале. В январе, марте и апреле он наблюдался по одному разу. Большею частью максимум осадков падал там или на июнь, или же на июль (24%). Минимум осадков в году ни разу не наблюдался в мае, июне, июле, августе и декабре; он главным образом падал на февраль (44%).

7. Колебания осадков. Рассмотрение выпадения осадков за ряд лет показывает, что ход осадков в действительности не имеет такого правильного характера, как ход температуры. Осадки являются очень изменчивым элементом. Для выяснения характера колебаний осадков нами для 8 станций с большим числом лет наблюдений были выписаны месячные и годовые максимумы и минимумы осадков и найдены их амплитуды колебания.

Максимальные и минимальные месячные и годовые суммы осадков.

Таблица 14.

У ю т н о е.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Максимум.	81,3	50,9	69,0	82,8	114,3	112,8	146,0	132,2	140,4	109,9	78,1	75,0	718,6
Год .	1915	1908	1914	1901	1903	1898	1896	1913	1905	1900	1910	1906	1905
Минимум .	8,5	6,3	3,4	0,0	11,0	5,2	11,7	21,8	3,6	2,0	4,1	5,6	335,6
Год .	1919	1910	1898	1918	1915	1901	1908	1909	1903	1896	1902	1897	1897
Амплитуда.	72,8	44,6	65,6	82,8	103,3	107,6	134,3	110,4	136,8	107,9	74,0	69,4	383,0