

В и х р о в к а.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Максимум.	45,1	30,1	59,2	72,1	101,3	153,4	184,8	144,2	89,4	81,0	73,6	54,4	655,1
Год .	1915	1915	1914	1924	1912	1916	1923	1925	1918	1919	1919	1913	1925
Минимум .	5,5	4,6	1,7	0,0	3,0	11,4	19,5	8,0	8,9	3,7	7,1	6,9	389,0
Год .	1919	1923	1923	1918	1920	1917	1921	1929	1923	1915	1926	1911	1924
Амплитуда.	39,6	25,5	57,5	72,1	98,3	142,0	165,3	136,2	80,5	77,3	66,5	47,5	266,1

Богородицкое - Фенино.

Максимум.	81,4	63,3	87,1	80,7	162,8	162,1	185,6	155,8	86,2	118,2	75,1	72,1	720,5
Год .	1915	1899	1895	1893	1912	1903	1923	1896	1912	1894	1909	1896	1910
Минимум .	1,0	0,7	3,7	0,7	14,2	23,6	11,7	8,3	0,3	0,5	4,3	3,3	264,2
Год .	1894	1920	1908	1918	1904	1924	1900	1929	1909	1896	1902	1924	1891
Амплитуда.	80,4	62,6	83,4	80,0	148,6	138,5	173,9	147,5	85,9	117,7	70,8	68,8	456,3

П о о к р у г у.

Максимум.	117,0	76,3	87,1	95,0	162,8	206,0	212,6	155,8	140,4	167,0	138,8	124,3	801,3
Год .	1915	1894	1895	1893	1912	1890	1903	1896	1905	1894	1919	1918	1925
Минимум .	1,0	0,7	1,7	0,0	3,0	5,2	11,7	3,0	0,0	0,0	2,6	3,3	264,2
Год .	1894	1920	1923	1918	1920	1901	(1900 1908	1900	1903	1896	1926	1924	1891
Амплитуда.	116,0	75,6	85,4	95,0	159,8	200,8	200,9	152,8	140,4	167,0	136,2	121,0	537,1

Из приведенной таблицы видно, что колебания осадков в течение года могут быть очень большими. Возможны такие годы, когда осенью, или весной в течение целого месяца осадков совсем не бывает (апрель 1918 г., сентябрь 1903 г., октябрь 1896 г.). В остальное время года могут быть такие месяцы, когда выпадает слишком малое количество осадков, совершенно недостаточное даже для незначительного увлажнения почвы.

И вместе с тем бывают годы, когда осенью месячная сумма осадков доходит до 150 м.м., а летом до 200 м.м. и более.

Месячная амплитуда колебания осадков по округу имеет определенный годовой ход. Наименьшие колебания осадков наблюдаются в феврале, — амплитуда минимальная. В следующие месяцы амплитуда возрастает и летом в июне и в июле колебания осадков наибольшие, месячная амплитуда максимальная. В августе колебания осадков уменьшаются и в сентябре второй минимум месячной амплитуды осадков. В октябре колебания осадков увеличиваются, наблюдается второй максимум месячной амплитуды осадков. После этого идет уменьшение амплитуды, колебания уменьшаются. Таков характер колебаний осадков в течение года.