

Болота и торфяники ¹⁾.

„Формацию болот“, говорит В. Н. Сукачев, „трудно резко отграничить от водной формации, так как между прибрежной растительностью и болотной встречается масса переходов“.

„Все наши болота относятся к так-называемым луговым болотам, моховых болот (сфагновых) не найдено вовсе“; это замечание В. Н. Сукачева относится к юго-восточному углу Курской губ. — на севере губернии сфагновые болота были в самое недавнее время. Так, мною найден был торфяной мох (сфагнум) на территории Курской губ. в трех местах: 1) в окрестностях города Курска в углу между двумя пересекающимися линиями железных дорог: Севастопольской и Киево-Воронежской, на болоте, близ бывшего „харьковского“ леса в 1901 году; 2) на болоте в окрестностях деревни Старой Першины, быв. Дмитриевского уезда близ урочища „Рожни“ в 1903 г. и 3) наконец, в 1924 году мною была сделана экскурсия на так называемое „Моховое“ болото, более 250 дес. близ деревень Липницы, Нижнее Песочное и Сныткино. Болото это тянется на очень большое расстояние и принадлежит трем деревням; большая часть его уже осушена и превращена в осоковый луг, но со стороны дер. Липницы сфагнум на этом болоте уцелел и до настоящего времени. Интересно название соседнего болота „Клюквенное“, свидетельствующее о бывлой растительности данной местности, носившей еще в недавнее время такие явные следы бореальной ²⁾ флоры. В. Н. Сукачев исследованные им болота Курской губ. группирует в три типа: 1) камышевые болота, 2) осоковые болота, 3) гипновые-моховые болота ³⁾.

1) „Тип камышовых болот“ представляет тот случай, когда в мелком, 1—1½ арш. глубиной, бассейне растут высокие растения. Наиболее характерными растениями являются тростник и рогоз, к которым могут примешиваться различные другие болотные и прибрежные растения.

Этот тип распространен по берегам рек, озер, является пионером в деле зарастания бассейна.

2) Осоковые болота развиваются на заболоченных лугах, являясь чаще всего следующей за камышовым болотом, в процессе зарастания и усыхания болота. Наиболее характерными растениями являются болотные виды *Sagex* (Осок), затем некоторые злаки и другие болотные растения, не отличающиеся значительным ростом. „Эти болота по мере усыхания превращаются в обыкновенные луга и обыкновенно характеризуются значительными отложениями торфа, в которых почти всегда попадаются древесные остатки“.

3) Гипновые, моховые болота являются, так сказать параллельным осоковым: они также обыкновенно служат следующей стадией за камышовыми в усыхании болота; лишь изредка они развиваются иным путем, напр. возле дер. Недоступовки ⁴⁾, где они появились на месте вырубленного ольшатника, где камышового болота никогда не было. Подобно осоковым болотам, гипновые, усыхая, дают луга. Торф обыкновенно есть и достигает значительной толщины; не наблюдается этого только, когда они развиваются близ озер на песчаной почве, что относится и к осоковым болотам. Гипновые, моховые болота могут также являться в виде кочкарников“.

¹⁾ В этой главе мы приводим много выдержек из работы В. Н. Сукачева. „Очерки растительности Ю.-В. части Курской губ.“, как специалиста по изучению болот.

²⁾ Северной.

³⁾ Гипнум — мох, часто встречающийся по высыхающим болотам и сырым лугам.

⁴⁾ Белгородского уезда.