

„Нужно отметить тот интересный факт“, говорит далее Сукачев, „что гишновые моховые болота, находящиеся близ озер второй речной террасы, отличаются от таковых по балкам присутствием более северных, редких у нас видов, как пушица грациозная, трифоль, осока дерная, сабельник болотный, ива ползучая, ежеголовник малый и др.“¹⁾.

„Луга, развившиеся из этих болот, также в большинстве случаев носят более северный характер“.

Схема зарастания и высыхания озер, приводимая В. Н. Сукачевым для юго-востока Курской губернии:



„Факт“, говорит далее В. Н. Сукачев, „что теперь торфяники находятся там, где ныне растилаются луга, говорит за то, что прежде влаги было гораздо больше, чем теперь, что наши балки изобиловали непроходимыми болотами“.

О л ь ш а н н и к и.

Прибрежные низины часто бывают покрыты густыми ольховыми зарослями, иногда настолько густыми, что травянистая растительность в них может развиваться только на самый короткий срок, весной до появления листьев на деревьях. После распускания листвы земля бывает настолько затенена ими, что травянистая растительность бывает совершенно подавлена; но встречаются также ольховые заросли с разреженным покровом, где благодаря свету и постоянной влажности развивается особенно мощная травянистая растительность, часто значительно превышающая рост человека. Перевитые местными лианами: хмелем, вьюнком, повилкой; перепутанные выступающими над землей корнями ольхи и березы пушистой, сильно заболоченные леса эти бывают часто совершенно непроходимыми для человека, и потому здесь роскошно развивается дикая жизнь.

Весною черная илистая земля ольшанников покрывается сплошь желтоватой зеленью селезеночника, затем появляются гравилаты, осоки, маоротники, быстро взвиваются вверх по ветвям ольх и черемух молодые побеги хмеля, широко раскидывают свои огромные листья дягели, дудники (болиголовы), цветущие стебли которых ко 2-й половине лета достигают высоты свыше 3-х метров; сныти, таволги и др., а к концу лета расцветают желтовато-белые и пурпуровые головки осотов: огородного и болотного и поднимаются целые заросли посконника с его приятно душистыми, грязно-розовыми щитками цветов.

В этих зарослях в северной части губернии встречаются нередко темные кустики приземистой березы²⁾, черпотал, черная смородина, черемуха и береза пушистая с характерно выступающими, над уров-

¹⁾ Вышеупомянутые В. Н. Сукачевым виды, являющиеся редкими для юга губернии, на северо-западе губ., за исключением ивы ползучей, встречаются обыкновенно часто.

²⁾ *Betula humilis*.