

щины кола, их срубают на плетни, цепи и т. п., а трава между кустарником или запускается под покос или стравливается скотом.

В благоприятных случаях, когда такие кустарники отстоят на значительном расстоянии от деревень, между ними развивается интересный и очень богатая растительность степного характера. Чаще всего такие кустарники остаются по крутым склонам балок на местах, не удобных для пашни.

Осиновые рощи представляют особую формацию, часто возникающую на месте срубленного дубового леса. Светолюбивый дуб в таких случаях затеняется быстро растущей осинкой, которая размножается обильной корневой порослью и забивает дуб. Такие осиновые „острова“ можно наблюдать по всей губернии. Подлесок и травянистая растительность в таких лесах слабо развиты.

Березовые рощи мы находим на суческах и на прибрежных дюнах. Такие леса изобилуют открытыми полянами, прогалинами, на которых развивается богатая травянистая растительность, изобилующая степными видами. В таких лесах весною мы встречаем множество лиловых анемонов (сон трава), степной лиловый прис, дикую сливу (терновник), ракушник (цитизус), дрок, желтый песчаный бессмертник, на пригорках очиток едкий (седум), кошачью лапку, заячью капустку и т. п. сухолюбов.

В таких лесах мы находим много ароматических и лекарственных трав хорошего качества, напр., душицу, аютины глазки, валерьяну, чабер, золототысячник, генциану, гвоздики, зверобой, тысячелистник и др. Из древесных пород наблюдается примесь дуба.

Смешанные леса мы находим по крутым берегам рек, чаще всего на мергелях. Примером таких лесов могут служить леса в окрестностях г. Рыльска по берегу Сейма, Присвалские леса в Злыдиной, Черной грязи, Сныткиной и др., леса в окрестностях Старого Оскола, леса правого берега Тускари у Шуклинки и Сапоговой (правда, сильно поредевшие за последнее время). Во многих лесах этого типа мы встречаемся с богатейшим по своему составу и разнообразию подбором лиственных пород деревьев и кустарников. Трудно придумать какой-нибудь вид из лиственных деревьев умеренной полосы Европейской России, который не встречался бы в этих лесах.

Здесь представлены все пять ярусов лесной растительности: первый ярус составляют дубы, березы, осина, черноклен, дикая груша, вяз; второй ярус составляют деревья 2-й величины: рябина, черемуха, яблоня, пробковый вяз, ива бредина, клен татарский и к ним же приходится приписать ясеню, липу, клен платановидный—деревья первой величины, но в условиях существования их в наших лесах они никогда не достигают полного своего роста. При выборной рубке их срезают на разные поделки в самом молодом возрасте. Третий ярус составляют кустарники: бересклеты европейский и бородавчатый, орешник, розы двух видов, терновник, иногда дикая вишня и дикий миндаль—более свойственные степным западинам и обнажениям, крушина ломкая и слабительная, дерен, калина, малина, боярышник. Четвертый ярус составляет травянистый покров со множеством интересных видов, из которых отмечаем особенно виды из семейства орхидей и, наконец, пятый ярус представлен различными видами мхов¹⁾.

1) Ст. М. П. Нагибной. „Краткий очерк растительности Курской губ.“ Бюллетени Московского Общества испытателей природы за 1924 г. Москва.