

С т е п и.

В губернии сохранились интереснейшие остатки целинной степи. В 16 верстах от г. Курска, близ полустанка Рышково М.-К.-В. ж. д. и т. наз. Селиховых дворов, до настоящего времени существует большая Стрелецкая степь, изученная и описанная проф. В. В. Алексиним в его интересной работе: „Очерк растительности и ее последовательной смены на участке „Стрелецкая степь“ под Курском“, см. „Труды С.-Петербургского Общества естествоиспытателей за 1909 г.“ Он отмечает характерную особенность этой степи, являющейся типичным образцом степи—лесостепной зоны, весьма отличной от центральной степной зоны, заключающейся в преобладании в Стрелецкой степи двудольных растений над однодольными, в частности, над злаками. Он отмечает также нахождение в степи интерзональной растительности (дубовых кустарников по балкам и северным склонам) и на угнетенное сравнительно с другими злаками положение ковыля в то время, как в степях центральной степной зоны ковыли являются преобладающими над всеми другими видами злаков.

Также в окрестностях г. Курска им была обследована другая „Казацкая степь“¹⁾, лежащая от Курска по направлению на Ю—ЮВ на 19½ верст. Степь эта лежит на водоразделе между реками Млодадью и Полной, притоками Сейма, близ с. Любичского и на расстоянии 7½ верст от Стрелецкой степи. На основании изучения окружающей растительности, В. В. Алексин приходит к выводу, что „флора южн. части Курского уезда представляет из себя нечто целое, нечто общее по своему происхождению, резко отличающееся от флоры северной части уезда, расположенной к северу от реки Сейма, делящей уезд в широтном направлении на две почти равные половины“. „Наши Казацкая и Стрелецкая степи, наши разбросанные там и сям степные склоны являются лишь раз'единенными участками той общей растительности, которая покрывала в свое время весь юг Курского уезда. Эта растительность была, по всей вероятности, тождественна с флорой описанных степей и представляла обширную луговую степь“. Обе степи вплоть до настоящего времени представляли из себя нетронутую целину пространством по 1200, 1300 дес. каждая.

В 18 верстах от г. Старого Оскола сохранился также крупный участок целины в 1200 дес., так наз. Ямская степь, принадлежащая гражданам Ямской слободы, владеющим этою степью со времен Екатерины II, которая, как они говорят, „подарила эту степь ямщикам за то, что вывезли ее из трясины, и не велела распахивать“. Они пользуются покосом и выпасом для скота и пока что не собираются распахивать.

В нынешнем году 2-го июля мне удалось побывать на этой степи. Ее только что собирались косить. Большинство трав уже отцвело и степь имела однообразно бурую окраску, по которой кое-где виднелись пышные „кисейные кусты“—Гинсофила паникулята (перекати-поле). Характерные степные растения были уже почти все отцветши и со зрелыми семенами: ломонос цельнолистный, шалфей пониклый, вероника австрийская, сочевник седоватый, ирис, василек беловойлочный, триния Гофмана, адонис верналист и др. На степи в цвету были лен многолетний, черноголовка крупноцветная, гвоздики—

¹⁾ В. Алексин. „Казацкая степь Курского уезда в связи окружающей растительностью“. Труды С.-Петербургского Общества естествоиспытателей за 1910 г.