

и большими, сильными прыгательными задними ногами, как у кузнечика. В те же годы вместе с пруссиком размножается *крестовая кобылка*, и некоторые другие виды кобылок (голубокрылая и др.). Крестовая кобылка меньше пруссика, серая с белыми отметинами в виде креста на груди (сверху).

Массовое размножение саранчевых в Курской губернии наблюдалось в 1897—99 г.г., 1910—1912, наконец в 1923 году. В первый период имеются сведения о массовом размножении в б. Путивльском уезде, последние же два периода относятся к б.б. Новооскольскому и Корочанскому уездам.

Коренное местообитание саранчевых—овраги, склоны, целины и залогии—все те места, где селится и другой массовый враг земледельца—суслик. Места эти покрыты сорной или степной растительностью и дают приют саранчевым, которые, никем не беспокоимые, закладывают там свои яичные кубышки. Регулируются саранчевые в своем размножении отчасти и самой природой—сырая осень и теплая зима служат зачастую благоприятным условием для размножения внутри саранчевых особых микроскопических грибов, являющихся в таких случаях причиной повального мора саранчевых; паразитные мухи—тоже являются истребителями саранчевых; в юго-восточных степях России саранчевых истребляют паразитные жуки из семейства нарывников, но в Курской губернии данных о деятельности этих жуков пока не имеется.

*Перелетная саранча* (собственно и есть настоящая—большая, зеленая с короткими усиками) встречается в губернии единичными особями.

Активная борьба с саранчевыми велась в Курской губернии в 1892 году и в 1923 г. В первом—применялся метод опрыскивания парижской зеленью, в 1923 году—помощью отравленных приманок.

На огородах, а также и по полям, попадаетея *медведка*—большое коричневое насекомое, с расширенными передними лапками, как у крота. Медведку легко найти летом на огородах, особенно в сырых местах под доской, камнем или иным прикрытием. Это насекомое роет длинные и сложные ходы, с особой центральной камерой, где самка откладывает яички и их сторожит (один из немногих примеров заботы о потомстве у насекомых).

В садах на плодовых деревьях зачастую попадаетея *уховертка*, иногда зовущаяся *клещаком*. Хотя в иные годы и бывает кой-какой вред от этих насекомых, но в общем это безобидное существо и совсем не оправдывающее своего названия: в уши уховертка залазит не чаще, чем какое-нибудь другое насекомое. Клещи у уховертки служат исключительно для расправления нижних кожистых крыльев для летания. Эти крылья кроме того, что складываются продольно веерообразно, еще складываются дважды поперек, почему уховертка без помощи клещей их и не может развернуть.

Страшный бич Курского садоводства, маленькое насекомое с 4-мя зелеными прозрачными крылышками—*яблонная медяница*—в первые 15 лет настоящего столетия размножилась до чрезвычайности. По саду нельзя было пройти летом, чтобы мириады этих насекомых, спугнутых с веток не садились на платье, не забивались в глаза, нос, уши. С 1917 года началось быстрое уменьшение яблонной медяницы, благодаря особому грибку. Этот грибок подобен тому грибку, от которого осенью массами мрут мухи, прилепляясь к стеклам и стенам. И