

дов расширяются, при чем в абсолютных величинах расширение по сравнению с исходным периодом достигло 64.389 дес., а в относительных 70%; площадь под сахарной свеклой расширялась значительно быстрее, нежели под картофелем.

4) Конопля (отчасти лен) дает следующие изменения:

1881—99 г.г.	65.330 дес.— 100%
1900—06 г.г.	70.911 дес.—108,8%
1910—14 г.г.	59.823 дес.— 91,6%

Конопля обнаружила неустойчивость—во втором периоде расширилась на 8,6%, а в предвоенном быстро сократилась, заняв площадь на 8,4% меньше исходного периода.

5) Подсолнух обнаруживает еще большую, чем конопля, неустойчивость, что видно из следующих данных о площади посевов его по периодам:

1881—99 г.г.	24.851 дес.— 100%
1900—06 „	27.078 „ — 109,2%
1910—14 „	17.930 „ — 72,3%

Таким образом, анализ данных о движении посевных площадей и изменении положения отдельных культур по губернии в целом приводит к следующим общим выводам:

1) посевная площадь по всем рассматриваемым периодам остается без существенных изменений;

2) в строении же посевной площади произошли весьма существенные изменения, по группам культур таковые:

	плюс (увелич.)	минус (уменьш.)
Озимые хлеба	— 6,1 проц.	
Яровые зерновые	— 3,8 „	
Корне-клубнеплоды	+ 70,0 „	
Конопля	— 8,4 „	
Подсолнух	— 27,7 „	

3) Заслуживают также быть отмеченными изменения в группе яровых зерновых, в особенности яровая пшеница и бобовые, которые обнаружили явную тенденцию к расширению.

Поуездные данные о посевных площадях за период 1910—14 г.г. приведены в табл. № 3.