

4) Корне-клубнеплоды дают по рассматриваемым периодам следующие изменения:

Культуры Периоды	Площ. корне- клубне- плодов	И з н и х:		Прин. 1881—99 за 100		
		Карто- фель.	Сахар свекл.	Корне- клубне- плоды	Карто- фель	Сахар свекл.
1881—99	11831	10029	1802	100	100	100
1900—06	13349	10709	2640	113,1	107,1	146,9
1910—14	15713	12113	3600	133,1	121,1	200
Плюс						
1881—99	Плюс	Плюс	Плюс	—	—	—
и 1910—14	3882	2084	1798			
1900—06	Плюс	Плюс	Плюс	—	—	—
и 1910—14	2364	1404	960			

Следовательно, корне-клубнеплоды за рассматриваемый период последовательно расширялись (100, 113,1 и 133,1), при чем относительно большее расширение имела сахарная свекла (вдвое против 1881—99 г.г.), хотя ее место в посевной площади в общем остается недостаточно заметным.

5) Конопля (и отчасти лен) дает следующие изменения:

1881—99 г.г.	19437 дес.	100
1900—06 „	19339 „	99,7
1910—14 „	16103 „	83,0

т.-е. без заметных изменений в абсолютной площади конопли прошел второй период (начало XX века); предвоенный период дал заметное сокращение площади посевов конопли, а именно: на 3334 дес. против первого периода, 3236 дес. против второго периода, в общем за все время на 17 проц., вследствие чего относительное место конопли в общей посевной площади понизилось (последовательно: 7,40, 7,50 и 6,60 проц.).

6) Подсолнух в рассматриваемом районе не имеет распространения.

Следовательно, основные черты эволюции полеводства в зерново-коноплеводственном районе за период 1881—99 и 1910—14 г.г. можно определить так:

- 1) общая посевная площадь сокращается;
- 2) озимые культуры сохраняют свое относительное место;