

поднялась до 15,3. Выше мы уже отмечали, что к концу XIX столетия особенно заметно было присутствие озимой пшеницы в Белгородском и Грайворонском уездах; поэтому представляется интересным проследить эволюцию ее в этих двух уездах особо, что и показано в нижеследующей таблице.

Озимые культуры в Белгородском и Грайворонском уездах:

Культуры Периоды	Площадь оз. хлеб.	И з н и х		Прин. 1881—99 за 100		
		Озим. рожь	Озим. пшен.	Озим. хлеб	Озим. рожь	Озим. пшен.
1881—99	112075 100	93767 83,6	18308 16,4	100	100	100
1900—06	118022 100	92283 78,2	25739 21,8	105,3	98,4	140,6
1910—14	112654 100	84578 75	28076 25	100,5	90,1	153,4

В этих двух уездах площадь озимого клина к предвоенному периоду осталась без изменений; озимая рожь сократилась на 10%; соответственно этому озимая пшеница возросла на 53,4%; озимая пшеница среди озимых хлебов последовательно занимала 16,4%, 21,8 и 25%, в то время как по району это составляло 11,2, 14,6 и 15,3; таким образом, посевы озимой пшеницы в южной части зерново-свеклосахарного района (Белгородский и Грайворонский уезды) расширялись быстрее, чем в остальной части этого района.

4) Яровые зерновые культуры показывают следующие изменения:

1881—99 г.г.	298747 дес.—100
1900—06 г.г.	287380 дес.—96,2
1910—14 г.г.	287098 дес.—96,1

Как видно, более заметное сокращение дают яровые зерновые культуры во второй период, оставаясь в последующем третьем периоде без изменения.

5) Корне-клубнеплоды в зерново-свеклосахарном районе последовательно расширяются:

1881—99 г.г.	47.121 дес.—100
1900—06 г.г.	69.275 дес.—147,1
1910—14 г.г.	91.153 дес.—193,5