

6) Конопля (и отчасти лен) показывают следующие изменения:

1881—99 г.г.	18.847 дес.—100%
1900—06 г.г.	22.059 „ —117,3
1910—14 г.г.	17.668 „ —94,0

иначе говоря, эволюция конопли в этом районе имеет общие для всей губернии черты: максимальное развитие в начале XX столетия и затем упадок к предвоенному периоду.

7) Подсолнух в этом районе за рассматриваемый период значения не имеет.

Итак, основные черты эволюции полеводства в зерново-свеклосахарном районе за период 1881—99 г.г. и 1910—14 г.г. можно свести к следующим положениям:

- 1) последовательное расширение посевной площади;
- 2) устойчивое положение озимых и яровых хлебов в целом; заметное расширение озимой пшеницы за счет озимой ржи;
- 3) расширение корне-клубнеплодов;
- 4) заметное сокращение конопли.

III. Зерново-подсолнечный.

1) Посевная площадь на протяжении двух последующих от исходного периодов сокращается, при чем темп сокращения представляется в следующем виде:

1881—99 г.г.	151.162 дес.—100
1900—06 г.г.	144.625 дес.—95,6
1910—14 г.г.	139.154 дес.—92,0

2) Озимые культуры последовательно абсолютно и относительно сокращаются, при чем озимая пшеница удерживается более прочно, что видно из нижеследующих данных.

Периоды	Озимые хлеба	И з н и х		Приним. 1881—99 за 100		
		Озимая рожь	Озимая пшен.	Озимые хлеба	Озим. рожь	Озим. пшен.
1881—99	59873	49360	10513	100	100	100
	100	82,5	17,5			
1900—06	55685	45756	9929	92,9	92,6	96,0
	100	82,1	17,9			
1910—14	49213	39614	9599	82,2	80,2	92,8
	100	80,5	19,5			