

Наряду с этим необходимо отметить существенное изменение во внутреннем строении этой части посевной площади, сущность которого сводится к быстрому росту яровой пшеницы (последовательно по периодам: 100,144 и 326) за счет в первую очередь овса (последовательно 100,65,5 и 51,9) и во вторую очередь крупных культур и подсолнуха.

4) Корне-клубнеплоды по трем рассматриваемым периодам представляются в следующем виде:

1881—99 г.г. 3455 дес.—100

1900—06 г.г. 3361 дес.—97,3

1910—14 г.г. 3275 дес.—94,9

Наблюдается последовательное сокращение.

5) Конопля (отчасти лен) показывают следующие изменения:

1881—99 г.г. 3062 дес.—100

1900—06 г.г. 2852 дес.—92,0

1910—14 г.г. 1984 дес.—64,0

Точно так же наблюдается сокращение культуры конопли и при том довольно заметное.

6) Подсолнух, характеризующий направление полеводства в этом районе, подвергся следующим изменениям:

1881—99 г.г. 12296 дес.—100

1900—06 г.г. 14681 дес.—119,3

1910—14 г.г. 9222 дес.— 75

Эти данные показывают, что подсолнух наибольшую роль играл в начале XX столетия; к предвоенному периоду он в значительной мере утратил свое место.

Итак, основные черты эволюции полеводства в зерново-подсолнечном районе за период 1881—99 г.г. и 1910—14 г.г. можно свести к следующим положениям:

1) сокращение общей посевной площади;

2) сокращение озимого клина, как следствие первого положения;

3) расширение яровых зерновых культур за счет, очевидно, усиления в этом районе пестрополья;

4) особенно заметный рост яровой пшеницы и, наоборот, заметное сокращение культуры овса;

5) общее сокращение интенсивных и специальных культур (в особенности подсолнуха), что является показателем усиливающейся тенденции к зерновому строю полеводства.

IV. Собственно-зерновой.

1. Посевная площадь на протяжении трех рассматриваемых периодов подверглась следующим изменениям в сторону сокращения:

1881—99 г.г. 918737 дес.—100

1900—06 г.г. 923173 дес.—100,5

1910—14 г.г. 884764 дес.— 96,3