

% жеребят в стаде превышал обычную норму, что служило показателем того, что в дальнейшем должен был последовать процесс более интенсивного восстановления рабочего стада.

В 1925 году вновь последовало сокращение как общего конского поголовья, так и крайних групп его (взрослых лошадей и жеребят), внутреннее же строение рабочего стада приняло следующий вид:

% взр. лош	% мол. ст. 1 г.	% жеребят.
74.0%	14.2	11.8

Такое благоприятное соотношение возрастных групп, сохранившееся несмотря на неблагоприятный год, дает основание считать, что в ближайшие годы восстановление конского поголовья пойдет более быстрым темпом, чем до 1924 года.

Крупно-рогатое скотоводство. Количественный и возрастной состав крупного рогатого скота изменялся следующим образом (в тысячах голов):

Годы	Коров	Молодняка старше 1 года	Молодн. молоче 1 года	Итого (без быков)	В %-х. к 1916 году
1916	340.8	96.2	237.6	674.6	100
1920	381.1	30.2	118.9	530.2	78.6
1924	453.9	126.9	326.3	907.1	134.5
1925	438.8	94.0	244.1	776.9	115.2

Тоже в %-х по каждой группе к 1916 году.

Годы	Коров	Молодня- ка ст. 1 года	Молодня- ка мол. 1 года
1916	100	100	100
1920	111.8	31.4	50.0
1924	133.2	131.9	137.3
1925	128.7	97.7	102.7