

Воздухъ.

Воздухъ вообще здоровъ, исключая мѣстъ въ которыхъ, въ осеннее время, производится моченіе пеньки, поражающее тяжелый запахъ, причиняющій сильныя головныя боли, впрочемъ безъ особенно опасныхъ послѣдствій. Главныя источники болѣзней суть: перемѣны времени года, быстрые и внезапные переходы отъ тепла къ холоду и обратно при сильномъ вѣтрѣ сѣверномъ или южномъ, обыкновенное вліяніе сырости при продолжительномъ дождѣ, тѣсныя и сырыя курныя избы, весеннее разлитіе рѣкъ. Перемежающіяся лихорадки, золотуха, иногда и цынга свирѣпствуютъ болѣе въ болотистыхъ мѣстахъ береговъ рѣкъ Свапы и Усожи.

Вѣтры.

Сильные жары бываютъ въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, а холодъ въ декабрѣ и январѣ. Въ 10-лѣтней сложности оказывается, что по наблюденіямъ, дѣланнымъ 3 раза въ сутки, а именно: въ 7 часовъ утра, въ 2 часа по полудни и въ 9 часовъ вечера, среднее направленіе вѣтровъ въ теченіи года было:

N.	NO.	O.	SO.	S.	SW.	W.	NW.	и др.
75.	175.	28.	253.	46.	174.	35.	119.	190.

Господствующій вѣтеръ, какъ видно, юго-восточный; сѣверо-восточный сопровождается почти всегда холодомъ; южный и восточный не такъ часты, полезны для края, теплы, и имъ сопутствуетъ дождь или мокрый снѣгъ; на возвышенныхъ мѣстахъ, во время равноденствія, дуетъ такъ называемый *многосторонній* вѣтеръ. Сильный вѣтеръ наблюдаемъ былъ среднимъ числомъ въ годъ 65 разъ, но бури вообще очень рѣдки; въ теченіе ноября, декабря, января, февраля, марта, апрѣля и мая мѣсяцовъ, болѣе другихъ, дули періодически сѣверо-восточные, и юго-восточные вѣтры, въ прочіе мѣсяцы восточные и юго-восточные. Сильные вѣтры, въ концѣ лѣта дующіе, вредны для хлѣбовъ тѣмъ, что колосья ложатся на землю и зерно осыпается.

Дожди.

Дожди обыкновенно бываютъ болѣе весною и осенью, и продолжаются иногда отъ недѣли до трехъ, отъ эаго всѣ дороги болѣе или менѣе портятся, смотря по грунту: гдѣ черноземъ, то послѣ продолжительныхъ дождей нѣтъ почти проѣзда, отъ нихъ также разли-