

ваются рѣки и рѣчки, вода затопляетъ плотины и гати, а иногда все ихъ смываетъ, что крайнѣ вредитъ сообщенію и мельницамъ, которыя также не могутъ дѣйствовать при сильныхъ засухахъ, отъ недостатка воды. Вообще можно сказать, что дожди въ Курской губерніи умеренны. Замѣтно, что когда количество падающаго дождя и снѣга въ году, среднимъ числомъ, менѣе 20 дюймовъ, то урожай не такъ силенъ, но умолотъ хорошъ и зерно полновѣснѣе, а болѣзни болѣе воспалительнаго свойства; когда же количество выпавшаго дождя болѣе 20 дюймъ, то урожай хлѣба и сѣна сильный, но умолотъ дуренъ, зерно легче, а болѣзни лихорадочнаго свойства.

Туманы.

Въ Курской губерніи туманы весьма обыкновенны, и являются весною и осенью; рѣдко продолжаются болѣе дня; особеннаго вліянія, по непродолжительности ихъ, на здоровье людей и на произрастѣнія не имѣютъ; наблюдатели говорятъ, что, будто бы, въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ, послѣ лѣтнихъ, утреннихъ, легкихъ тумановъ, на листьяхъ деревьевъ оказывались желтыя мелкія пятна; приписываютъ же они это дѣйствію холернаго воздуха. Извѣстно, что зараза свирѣпствовала по всей губерніи въ продолженіи 1847 и 1848 годовъ.

Градъ.

Градъ рѣдко падаетъ, но при паденіи значительно охлаждаетъ температуру иногда на пространство въ окружности болѣе 20 верстъ.

Снѣгъ.

Снѣгъ вообще рѣдко покрываетъ все пространство Курской губерніи; на черноземѣ стелется довольно ровно, на пескахъ же сугробами; иногда бываетъ толщиною въ 6 вершк. большею частию же только въ $1\frac{1}{2}$; зимніе пути отъ этого рѣдко бываютъ такъ хороши, какъ въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи, но однако довольно удобны для савной ѣзды; зимній путь устанавливается не ранѣе января мѣсяца, и держится не долѣе марта; снѣга таютъ очень медленно; рѣки замерзаютъ въ половинѣ декабря; а вскрываются въ началѣ апрѣля. При замерзаніи рѣкъ и озеръ, ледъ подымаетъ людей и большія тяжести.

Землетрясеніе.

Сильное землетрясеніе было за 40 лѣтъ назадъ, но о немъ нельзя было достать никакихъ подробныхъ свѣденій; съ тѣхъ поръ бы-