

гектаров и в 1927 г. — 155,0 тыс. гект., или в относительных цифрах 100, 212 и 237.

Увеличение посевов картофеля выдвигает необходимость улучшения качества посевного материала путем подбора ассортимента картофеля, наиболее соответствующего естественно-историческим и хозяйственно-экономическим условиям отдельных районов губернии.

Коллективные опыты проводились гнездовым методом в следующих 7 пунктах, охватывающих все естественно-исторические районы губернии:

Название	Род почвы	Число крест. опытов.	Количество делянок
1. Рыльское	Лесн. земли .	7	56
2. Конышевск., Льговск. у. .	" " . . .	6	72
3. Охочевское, Щигр. у. . .	Выщел. черн.	5	60
4. Ракитянск., Грайв. у. . .	Чернозем . .	7	70
5. Вислоевское, Белгор. у. . .	Мошн. черн. .	6	60
6. Солнцевск., Курск. у. . .	Выщел. черн.	7	98
7. Бобровское, Ст. Оскол. у. .	Мошный черн.	8	96
Итого . . .	—	46	512

Метеорологические условия вегетационного периода характеризуются таблицей, составленной по материалам ближайших метстанций.

Название гнезд Мес.	Средние месячн. температуры:					Количество осадков:				
	V	VI	VII	VIII	IX	V	VI	VII	VIII	IX
Рыльское . . .	13,2	19,7	20,1	20,6	15,3	54,9	33,0	42,8	51,4	12,1
Конышевское .	12,4	19,3	19,7	20,4	14,5	68,2	88,0	79,4	63,9	29,1
Охочевское . .	12,0	18,6	19,7	13,9	13,9	46,4	156,9	98,5	52,4	20,9
Ракитянское . .	13,5	19,5	19,6	21,0	15,8	50,1	119,3	64,9	97,7	20,9
Вислоевское . .	13,7	19,8	19,8	20,6	15,0	23,4	169,0	57,5	80,6	29,0
Солнцевское . .	13,1	18,9	18,9	20,0	14,5	45,8	149,0	48,3	62,5	44,0
Бобровское . .	13,1	19,2	19,0	20,4	14,8	32,4	68,5	75,7	78,5	18,3

