

Длина вегетационного периода для каждого сорта определяется таблицей:

Название сортов	Местный	Победа	Золотой Дождь	Лигово II	Лейтевицкий	Лоховский	Диппе	Пфлюг	Кирше	Кёнигс	Люненбургский
Количество дней . .	97	98	91	98	99	97	99	98	97	98	100

Произведенный во время кушения энтомологический анализ дал следующие результаты:

Наименов. сортов Наименов. вредит.	Местный	Победа	Зол. Дождь	Лигово II	Лейтевицкий	Лоховский	Диппе	Пфлюг	Кирше	Кёнигс	Люненбургский
Шведская мушка . .	3,03	5,05	2,8	2,75	3,05	1,8	7,1	4,35	2,9	12,55	3,45
Рессенская „ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стеблевая муха . . .	0,23	—	—	0,65	0,2	—	0,45	0,5	0,6	1,0	0,2
„ блоха . . .	—	1,3	—	—	0,4	—	0,15	0,15	0,5	0,2	3,7
Ржавчина	2,5	2,65	6,45	2,6	3,2	3,4	5,65	4,15	2,15	4,55	2,8

Из таблицы видно, что повреждения шведской мушкой встречаются у всех сортов, но в значительной степени у „Кёнигс“ и „Диппе“. Ржавчиной повреждены все сорта, из них „Кёнигс“, и „Диппе“ и „Золотой Дождь“ выделяются высоким % повреждения.

Данные учета урожая могут быть представлены следующей таблицей:

Название сортов	Урож. зерна в цент. на гект.	Урож. соломы в цент. на гект.	Отношение зерна к соломе	Абс. вес	Название сортов	Урож. зерна в цент. на гект.	Урож. соломы в цент. на гект.	Отношение зерна к соломе	Абс. вес
Местн. Шатилов	18,13	32,91	0,5 : 1	24,24	Диппе	19,1	33,6	0,5 : 1	24,69
Победа	20,7	36,7	0,6 : 1	27,25	Пфлюг	18,1	30,45	0,6 : 1	20,98
Золот. дождь.	20,81	39,6	0,5 : 1	20,10	Кирше	23,7	45,5	0,5 : 1	21,0
Лигово II	20,96	38,5	0,5 : 1	28,64	Кёнигс	18,3	42,1	0,4 : 1	24,8
Лейтевицкий.	17,9	36,4	0,5 : 1	17,90	Люненбургск.	18,3	34,0	0,5 : 1	26,85
Лоховский	19,80	29,7	0,6 : 1	19,50					