

б) Раструска навоза сейчасъ послѣ стаянія снѣга и по мѣрѣ таянія кучъ навоза.

в) Запашка навоза на $2\frac{1}{2}$ вершка, когда средняя суточная температура почвы на глубинѣ 50 сант. установится на 9° Цельсія.

г) Однократное прикатываніе кольчатымъ каткомъ вслѣдъ за запашкой, а если нужно, то и накрестъ.

д) Боронованіе непосредственно передъ двойкой.

е) Двойка на $3\frac{1}{2}$ верш., когда навозъ настолько перепахъветъ, что перетирается въ рукахъ безъ особеннаго усилія (приблизительно черезъ 1 — $1\frac{1}{2}$ мѣс.)

ж) Послѣ двойки немедленное вслѣдъ за плугомъ боронованіе.

з) Обработка 5-лапчатымъ экстирпаторомъ Овсянскаго или бороною по мѣрѣ появленія сорной растительности и образованія коры.

и) Лущеніе на $1\frac{1}{2}$ — 2 вершка передъ посѣвомъ.

к) Боронованіе передъ рядовымъ посѣвомъ.

5. Удобренный средній зеленый паръ (ЗСУД $2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2}$).

а) Вывозка навоза въ маѣ по возможности близко къ дню запашки по расчету 2400 пуд. на дес.

б) Немедленная раструска.

в) Запашка навоза на $2\frac{1}{2}$ вершка съ 25 мая по 1 іюня.

г) Прикатываніе кольчатымъ каткомъ вслѣдъ за запашкой.

д) Боронованіе въ 1 — 2 слѣда непосредственно передъ двойкой.

е) Двойка на $3\frac{1}{2}$ вер., когда навозъ достаточно перепахъветъ (см. ЗРУД.)

ж) Послѣ двойки немедленное вслѣдъ за плугомъ боронованіе.

з) Обработка 5-лапчатымъ экстирпаторомъ Овсянскаго или бороною по мѣрѣ появленія сорной растительности и образованія коры.

и) Лущеніе на $1\frac{1}{2}$ — 2 вершка передъ посѣвомъ.

к) Боронованіе передъ рядовымъ посѣвомъ.

6. Неудобренный двоенный ранній зеленый паръ (ЗРДВ $2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2}$).

а) Вспашка на $2\frac{1}{2}$ вер. одновременно съ запашкой навоза на раннемъ удобренномъ пару.

б) Немедленное прикатываніе кольчатымъ каткомъ.

в) Боронованіе въ 1 — 2 слѣда непосредственно передъ двойкой.

г) Двойка на $3\frac{1}{2}$ вер. одновременно съ двойкой удобреннаго ранняго пара.

д) Послѣ двойки немедленное вслѣдъ за плугомъ боронованіе.

е) Обработка 5-лапчатымъ экстирпаторомъ Овсянскаго и бороною по мѣрѣ появленія сорной растительности и образованія коры.

ж) Лущеніе на $1\frac{1}{2}$ — 2 вершка передъ посѣвомъ.

з) Боронованіе передъ рядовымъ посѣвомъ.