

к) Учетъ опытовъ производится для ржи и пшеницы на всѣхъ дѣлянкахъ.

Примѣчаніе. Желательно производить опредѣленіе половы и хоботья въ урожаѣ дѣлянки по 100 пробнымъ колосьямъ; на основаніи опредѣленія отношенія вѣса половы хоботья къ вѣсу зерна въ 100 колосьяхъ вычисляется вѣсъ половы и хоботья въ урожаѣ.

III. Третье поле—пропашныя и бобовыя растенія.

Изъ бобовыхъ для посѣва выбрана чечевица, изъ пропашныхъ картофель. Дѣлянки озимаго поля дѣлятся *поперекъ* для посѣва бобовыхъ и пропашныхъ.

Чечевица — сортъ „Тарелочная“.

а) Осенью вспашка 10—20 сентября на $3\frac{1}{2}$ в.

б) Весною возможно раннее боронованіе.

в) Посѣвъ рядовой по расчету 6 пуд. на десятину.

г) Выдергиваніе крупныхъ сорныхъ травъ.

Учетъ опытовъ производится только для дѣлянокъ, занятыхъ въ предыдущемъ году рожью послѣ всѣхъ видовъ пара.

Картофель — сортъ „проф. Меркерь“.

а) Осенью 10—20 сентября вспашка на $3\frac{1}{2}$ верш

б) Возможно ранняя весенняя бороныба.

в) Посадка съ 25 апрѣля по 1 мая по маркеру цѣльными клубнями средняго размѣра, по одному въ гвѣздо.

г) Посадка производится подъ лопату на $2\frac{1}{2}$ верш. глубины, въ клѣтку (14×14 верш.)

д) При появленіи всходовъ боронованіе легкой бороной въ 1—2 слѣда.

е) Мотыженіе при появленіи сорной растительности.

ж) Окучиваніе коннымъ орудіемъ до цвѣтенія при вышинѣ растеній 4—6 вершковъ.

з) Второе окучиваніе во время появленія бутоновъ.

и) До уборки поле держится въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ.

к) Уборка ручная при засыханіи ботвы, которая послѣ уборки свозится съ поля.

л) Взвѣшиваются только клубни. Опредѣленіе % — а) недозрѣвшихъ и мелкихъ и б) среднихъ и крупныхъ клубней производится по 10 среднимъ пробнымъ кустамъ.

Учетъ опытовъ производится только для дѣлянокъ, занятыхъ въ предыдущемъ году рожью, послѣ всѣхъ видовъ пара.