Тимской .	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	13	9	4	—	—
				1										1	1			
Дмитріевск	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	6	4	—	29	26	3	—	—
Фатежскій.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	18	21	18	1	2	—
	2	8						7	4	6		4		29	23	8		
Щигровск.	—	3	8	—	—	—	—	—	2	6	47	29	6	101	19	4	75	3
											14	1	8	23	16	4		3
Всего .	9	34	27	20	25	16	26	131	367	699	783	240	149	2517	1838	486	185	17
	15	81	62	99	44	143	135	278	522	601	598	533	192	3288	2449	820	11	23

Бѣглый взлядъ на таблицу позволяетъ сдѣлать заключеніе, что сильная, рѣзко выраженная эпидемія скарлатины была въ 3-хъ южныхъ уѣздахъ—Грайворонскомъ, Бѣлгородскомъ и Корочанскомъ; въ уѣздахъ же, полосою расположенныхъ по теченію р. Сейма—Путивльскомъ, Рыльскомъ и Курскомъ скарлатина дала слабо выраженную эпидемію.

Эпидемія скарлатины отчетнаго года тоже началась въ концѣ предъидущаго. Больныхъ скарлатиной въ 85 году до октября наблюдалось по всей губерніи $134/_{168}$, а съ октября до конца года—$231/_{266}$. Въ эти послѣдніе мѣсяцы года были намѣчены мѣста эпидемій отчетнаго года. Въ Грайворонскомъ уѣздѣ съ ноября больные начали встрѣчаться въ южной его части; въ Бѣлгородскомъ въ разныхъ мѣстахъ уѣзда; въ Корочанскомъ съ октября, даже съ сентября (с. Плющины)—въ сѣверной части уѣзда. По р. Сейму въ Курскомъ уѣздѣ начало обрисовываться эпидемическое гнѣздо въ сѣверо-западномъ углу уѣзда уже съ сентября; въ Рыльскомъ въ средней полосѣ уѣзда тоже съ сентября; въ Путивльскомъ въ южной части уѣзда —съ ноября. Только въ Фатежскомъ уѣздѣ въ южной его части распространенная, хотя и не сильно выраженная эпидемія, начавшаяся съ іюля, начала потухать въ декабрѣ, давши только ничтожные остатки для отчетнаго года.

Во всѣхъ намѣченныхъ гнѣздахъ въ теченіе первой половины года эпидемія, хотя и держалась упорно, но очень медленно распространялась и давала такъ мало больныхъ, что только совокупность наблюденій позволяла правильно оцѣнивать ихъ значеніе. Въ южныхъ уѣздахъ съ іюля, а въ срединныхъ расположенныхъ по р. Сейму, съ августа эпидемія замѣтно начинаетъ разгораться и достигаетъ наибольшаго развитія въ Грайворонскомъ уѣздѣ въ сентябрѣ, а въ Бѣлгородскомъ и Корочанскомъ въ октябрѣ. Въ срединныхъ уѣздахъ, гдѣ эпидемія была слабо выражена, невозможно указать съ опредѣленностью времени наибольшаго ея напряженія.

Въ сентябрѣ и октябрѣ, въ моментъ наибольшаго напряженія эпидеміи, она начала распространяться въ сосѣднія съ пораженными мѣстностями. Съ

этого же времени начали встрѣчаться больные скарлатиной и во всѣхъ другихъ уѣздахъ, кромѣ Обоянскаго. Въ декабрѣ эпидемія замѣтно начала уменьшаться, хотя все еще было отмѣчено $149/_{192}$ больныхъ.

Всѣхъ больныхъ наблюдалось въ губерніи $2517/_{3288}$; изъ нихъ умерло $486/_{820}$—23,3%. Колебаніе % смертности въ разныхъ мѣстахъ губерніи было невелико, только въ Путивльскомъ уѣздѣ смертность достигла 35%.

По временамъ года больные распредѣлялись такъ: весною—$61/_{286}$, лѣтомъ—$524/_{935}$, осенью—$1722/_{1732}$, зимою—$210/_{335}$.

Не входя въ подробности относительно отдѣльныхъ эпидемій, которыя описаны въ обзорахъ отдѣльныхъ уѣздовъ, я укажу здѣсь только на особенности нѣкоторыхъ эпидемій.

Эпидемія въ Грайворонскомъ уѣздѣ медленно, но правильно подвигалась съ юга на сѣверъ уѣзда, только распространеніе ея строго ограничилось бассейномъ р. Ворсклы, которая орошаетъ южныхъ $^2/_3$ уѣзда; въ сѣверной трети уѣзда, принадлежащей къ бассейну р. Псла, больныхъ скарлатиной не было.

Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ такой правильности въ распространеніи болѣзни не было: больные наблюдались въ разныхъ частяхъ уѣзда. Можетъ быть, связь преемственности между отдѣльными эпидемическими гнѣздами разныхъ частей уѣзда ускользнула отъ наблюденія медицинскаго персонала, подвергавшагося коренному переустройству въ теченіе отчетнаго года.

Въ Корочанскомъ уѣздѣ наибольшаго развитія достигла эпидемія въ сѣверной его части, откуда она двигалась на югъ уѣзда, гдѣ однако она не достигла одинаковаго напряженія. И здѣсь нужно указать на то, что, не смотря на сильную эпидемію въ сосѣдней Подольщанской волости, въ Ратьковской волости, которая не принадлежитъ къ бассейну Сѣвернаго Донца и притока его Корочи (очагъ скарлатинной эпидеміи), а къ бассейну р. Сейма, больные встрѣчались единицами. Въ сосѣднемъ же Старооскольскомъ уѣздѣ, въ южной части котораго беретъ начало р. Короча, въ осенніе мѣсяцы наблюдалось довольно много больныхъ скарлатиной, именно въ южной части. Изъ Корочанскаго же уѣзда эпидемія распространилась въ южную часть Новооскольскаго, орошаемую р. Нижеголомъ, притокомъ Корочи. Эта часть Новооскольскаго уѣзда, какъ сказано выше, не была совсѣмъ затронута эпидеміей кори, которая свирѣпствовала въ остальныхъ частяхъ уѣзда.

Другія эпидемическія гнѣзда не представляютъ общаго интереса.

Не во всѣхъ уѣздахъ врачи обозначаютъ формы тифа. Мнѣ кажется болѣе цѣлесообразнымъ поэтому поставить рядомъ сводныя таблицы свѣдѣній о тифѣ безъ обозначенія формы и брюшнаго тифа, чтобы разсматривать ихъ параллельно.