

чительно слабѣе. Въ приморской полосѣ къ обычнымъ вѣтрамъ принадлежатъ береговые бризы. Послѣдніе обусловливаются тѣмъ обстоятельствомъ, что горный склонъ, быстро нагрѣваясь послѣ восхода солнца, вѣетъ струей теплаго легкаго воздуха по направленію къ морю, откуда стремится потокъ болѣе холоднаго воздуха; съ заходомъ же солнца, наоборотъ, болѣе теплая струя воздуха стремится съ моря къ быстро охлажденному горному склону, откуда устанавливается прохладная тяга къ морю.

Вообще, относительно климата Крыма слѣдуетъ замѣтить, что крайнее разнообразіе топографическихъ особенностей страны создаютъ большое разнообразіе климатическихъ условій различныхъ уголковъ полуострова.

Почва южной части Крыма сравнительно очень плодородная, а сѣверной—въ большей части безплодная. Сѣверная и сѣверо-западная части полуострова представляютъ песчанныя, глинистыя или солончаковыя степи, производящія скудную растительность; восточная же часть степной половины Крыма — Керченскій полуостровъ, отличается плодородной глинисто-черноземной почвой; такая же плодородная почва находится и въ предгорьяхъ Крыма; въ окрестностяхъ Симферополя и вообще въ юго-западной части Тавриды, за исключеніемъ долинъ, почва малоплодородна, известковаго и глинисто-каменистаго состава. Горная часть Крыма, или собственно южный берегъ, отличается еще большимъ разнообразіемъ почвы: на сравнительно не-