

отъ оврага не только по величинѣ и формѣ, но и по времени образованія; если послѣдній является образованіемъ современнымъ, то балка, логъ или яръ, какъ часто ихъ называютъ въ Суджанскомъ уѣздѣ, съ его смѣшаннымъ велико и мало-рускимъ населеніемъ, сплошь и рядомъ ведетъ свое происхожденіе отъ временъ не только ледниковой эпохи (или, какъ иногда говорятъ, синхроледниковой эпохи), но, можетъ быть, даже и отъ болѣе отдаленнаго времени, хотя, безъ сомнѣнія, способъ образованія тѣхъ и другихъ былъ одинъ и тотъ же, съ тою только разницей, что оврагъ является результатомъ современнаго размыва, а балка или долина—древняго.

И если мы признаемъ по крайней мѣрѣ ледниковую древность долины р. Псла, и такихъ его притоковъ, какъ Илекъ и Суджа съ Локней, то почему мы должны думать, что синхроледниковый рельефъ долженъ быть ограниченъ только этими главными его чертами, а не могъ выразиться и болѣе мелкими, каковы долины р. Ворожбы, Рыбицы и тѣ балки, положіе склоны которыхъ одѣты, подобно склонамъ рѣчныхъ долинъ, мощнымъ лессовымъ и черноземнымъ покровомъ, маскирующимъ во многихъ мѣстахъ основной мѣловой остовъ и покрывающіе его, по П. П. Пятницкому, преимущественно во впадинахъ, третичные осадки? Если ужъ современному размыву приписывать роль, достаточную для образованія балокъ, то не удивительно ли, что этотъ размывъ оставляетъ лессовый покровъ на склонахъ тѣхъ же балокъ, хотя казалось бы, что гдѣ-гдѣ, а на этихъ склонахъ дѣятельность размыва должна быть наибольшей? Но въ томъ то и дѣло, что едва ли можно такъ преувеличивать размѣры современнаго (послѣдникаго) размыва, даже при тѣхъ условіяхъ рельефа, какія наблюдаются въ Суджанскомъ уѣздѣ. То, что можно ему приписать дѣйствительно, можно видѣть нерѣдко на самомъ дѣлѣ, притомъ въ Суджанскомъ уѣздѣ, при его мѣловомъ остовѣ, особенно рельефно: это смывъ лесса и чернозема *мѣстами* на склонахъ балокъ и долинъ, причемъ наблюдателю открывается какъ-бы бѣлая плѣшь среди общаго чернаго фона склоновъ балки или появляются мѣловые утесы въ берегахъ р. Псла, на ихъ окраинахъ, какъ напр. у с. Куриловки, которые бывають покрыты слоємъ всего въ 2—4 вершка чернозема; сюда же относятся, конечно, также овраги, и наконецъ въ самой долинѣ р. Псла—углубленіе всего дна долины (при блужданіи русла рѣки и сконцентрированіи на извѣстной площади усиленной дѣятельности размыва весеннихъ водъ) на ту глубину, на которую