

подъ первоукоснымъ клеверомъ у него отведенъ участокъ въ $\frac{3}{4}$ десятины, а подъ второукоснымъ $\frac{1}{2}$ дес., подъ рожью и овсомъ въ 1913 году было по $1\frac{1}{2}$ дес. или немного болѣе.

Причина такой неравномѣрности полей заключалась въ томъ, что какъ неопытный, но любознательный хозяинъ, прочитавъ въ какомъ-либо сельскохозяйственномъ журналѣ о какомъ-нибудь неизвѣстномъ ему растеніи, онъ горячо принимался за испытаніе рекомендуемаго растенія, отводя ему небольшую площадь земли. При неудачѣ въ культурѣ такого растенія — земля поступала подъ озимое, а чаще подъ овесъ, увеличивая такимъ образомъ площадь земли во второмъ или четвертомъ полѣ и тѣмъ нарушая ихъ равномѣрность. Однимъ изъ удачно испытанныхъ имъ растеній была озимая вика. Въ 1909—1911 г.г. онъ сѣялъ ее съ озимой рожью. Въ первый годъ получилъ средній урожай, но въ слѣдующіе 2 года вика сильно пострадала отъ морозовъ, особенно отъ весеннихъ, и урожай ея получился незначительный. Тогда Эктонъ рѣшилъ посѣять озимую вику весной съ овсомъ. Въ 1912 году результаты получились хорошіе. Несмотря на неблагоприятныя условія погоды при уборкѣ, онъ собралъ, при расчетѣ на десятину, свыше 150 пудовъ соломы, 64 пуда мякины и отъ 40 до 50 пудовъ сѣмянъ. Въ 1913 году урожай вики ожидался значительно выше.

Урожай клевера на его землѣ также хороши.

Съ площади въ $1\frac{1}{4}$ дес. онъ убираетъ свыше 350 пудовъ сѣна, причемъ участокъ клевера, площадью 11 саж. на 17 саж., оставляется на сѣмена. Съ такого участка въ 1911 году онъ собралъ до 2 пудовъ сѣмянъ, а въ 1912 году, — неблагоприятномъ для клевера, — собралъ 1 п. 10 ф.

Подъ люцерной находится $\frac{1}{4}$ дес. Косится она въ теченіе лѣта 3 раза и идетъ — на подкормъ скоту, который до уборки сѣна пасется на общемъ съ общинниками выгонѣ и не доѣдаетъ.

Учетовъ люцерны на сѣно не дѣлалось, но сѣменная люцерна, вызрѣвшая въ 1912 году, дала приблизительно 325—350 пудовъ сѣна на десятину. Количество сѣмянъ не приведено въ извѣстность.

Такимъ образомъ, того количества сѣна, яровой соломы, мякины и разныхъ отбросовъ хозяйства, которое собирается съ 9 дес. 856 кв. саж., вполне хватаетъ на прокормъ 7—8 шт. крупнаго скота и 8—10 шт. мелкаго скота. Часть овса продается на сторону.

Кормленіе скота до сего времени шло неравномѣрно: весь лѣтній, осенній и часть зимняго періода скотъ кормится вволю, а въ концѣ зимы и въ началѣ весны, когда корма на исходѣ и ихъ приходится беречь, — кормленіе становится менѣе обильнымъ. Несмотря на это, скотъ — въ кормежѣ тѣлѣ.

Съ осени 1913 года Эктонъ рассчитывалъ начать кормленіе дойныхъ коровъ по датскому способу.